Дрилл



Код АТХ:

- R02AA20

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Тетракаин
- Хлоргексидин
- Аскорбиновая кислота

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн] [мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн] [мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Пастилки без сахара*** полупрозрачные, круглой формы.

	1 пастилка
тетракаина гидрохлорид	0.2 мг
хлоргексидина биглюконат	3 мг

Вспомогательные вещества: аскорбиновая кислота - 52.5 мг, аммония глицирризинат - 5 мг, аспартам - 1 мг, изомальт - 2424.25 мг, ароматизатор 1 - 9.55 мг, ароматизатор 2 - 4.525 мг.

12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (1) - пачки картонные.
12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства
- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — местноанестезирующее, антисептическое.

Обладает антимикробной активностью (хлоргексидин), тормозит возбудимость болевых рецепторов..

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает антисептическое и анестезирующее действие при местном применении в ЛОР-практике.

Входящий в состав препарата хлоргексидин обладает противомикробным действием в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Кроме того, он оказывает также противогрибковое действие. Входящий в состав препарата тетракаин обладает периферическим местноанестезирующим действием на рецепторы слизистой оболочки полости рта и глотки, что обеспечивает анестезирующий эффект.

Фармакокинетика

В связи с низкой системной абсорбцией данные о фармакокинетике препарата Дрилл отсутствуют.

Показания к применению:

— инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки, не сопровождающиеся лихорадкой, образованием афт или нарушением целостности слизистой оболочки полости рта и глотки.

Относится к болезням:

- Инфекции
- Лихорадка

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к любым компонентам препарата;

— аллергические реакции на местные анестетики и хлоргексидин в анамнезе;

— детский возраст до 6 лет;

— фенилкетонурия (препарат содержит аспартам).

Способ применения и дозы:

Пастилку рассасывая, но не глотая, держат во рту до полного растворения. Продолжительность приема препарата Дрилл не должна превышать 5 дней. Между приемами препарата необходимо соблюдать интервал не менее 2-х часов. После приема препарата не рекомендуется: принимать пищу и напитки, а также чистить зубы в течение последующих 1-2 ч.

Взрослым и детям старше 15 лет по 1 пастилке 4 раза в день. Максимальная суточная доза - 4 пастилки.

Детям от 6 до15 лет - по 1 пастилке 2-3 раза в день. Максимальная суточная доза - 3 пастилки.

Побочное действие:

При применении препарата Дрилл по одобренному показанию и в рекомендуемых дозах возможно проявление следующих побочных явлений:

Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции.

Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: кожные высыпания.

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: преходящее окрашивание языка и зубов в коричневый цвет; временное онемение языка и глотки.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки препарата Дрилл не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Имеются ограниченные данные по применению препарата Дрилл при беременности и в период грудного вскармливания. Поэтому рекомендуется воздержаться от применения препарата во время беременности и грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия препарата Дрилл с лекарственными средствами других групп не выявлено. Тем не менее, не рекомендуется одновременный или последовательный прием препарата Дрилл и других местных антисептиков (особенно веществ анионной природы) из-за вероятности взаимодействия, приводящего, к антагонизму, инактивации и прочим проявлениям такого взаимодействия.

Особые указания и меры предосторожности:

Длительное применение (более 5 дней) препарата нежелательно из-за возможного нарушения нормального состава микрофлоры полости рта и глотки. В случае ухудшения или отсутствия улучшения самочувствия по истечении 5 дней рекомендуется обратиться к врачу.

После приема препарата не рекомендуется: принимать пищу и напитки, чистить зубы в течение последующих 1-2 ч.

Препарат Дрилл следует с особой осторожностью принимать спортсменам в связи с тем, что активные компоненты препарата способны вызывать положительную реакцию в тестах антидопингового контроля.

Окрашивание зубов или композитного пломбировочного материала нестойкое и в значительной мере может быть предупреждено с помощью ежедневной чистки зубов обычной зубной пастой, а в случае зубных протезов - применения традиционных чистящих средств.

Больным сахарным диабетом необходимо учитывать, что 1 пастилка содержит 0,2 хлебные единицы.

Энергетическая ценность 1 пастилки составляет 5,8 ккал.

В случае ухудшения самочувствия или появления необычных реакций, рекомендуется обратиться к врачу.

Влияние на способность управления транспортными средствами и механизмами

Препарат Дрилл не влияет на способность управлять автомобилем и другими механическими средствами.

Условия хранения:

В сухом месте при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Drill