

## Дрилл



### Код АТХ:

- [R02AA20](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Тетракаин](#)
- [Хлоргексидин](#)
- [Аскорбиновая кислота](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

#### Форма выпуска, описание и состав

♦ **Пастилки без сахара** полупрозрачные, круглой формы.

|                          | 1 пастилка |
|--------------------------|------------|
| тетракаина гидрохлорид   | 0.2 мг     |
| хлоргексидина биглюконат | 3 мг       |

Вспомогательные вещества: аскорбиновая кислота - 52.5 мг, аммония глицирризинат - 5 мг, аспартам - 1 мг, изомальт - 2424.25 мг, ароматизатор 1 - 9.55 мг, ароматизатор 2 - 4.525 мг.

12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (1) - пачки картонные.

12 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (2) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — местноанестезирующее, антисептическое.

Обладает антимикробной активностью (хлоргексидин), тормозит возбудимость болевых рецепторов..

#### Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает антисептическое и анестезирующее действие при местном применении в ЛОР-практике.

Входящий в состав препарата хлоргексидин обладает противомикробным действием в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Кроме того, он оказывает также противогрибковое действие. Входящий в состав препарата тетракаин обладает периферическим местноанестезирующим действием на рецепторы слизистой оболочки полости рта и глотки, что обеспечивает анестезирующий эффект.

**Фармакокинетика**

В связи с низкой системной абсорбцией данные о фармакокинетике препарата Дрилл отсутствуют.

**Показания к применению:**

— инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки, не сопровождающиеся лихорадкой, образованием афт или нарушением целостности слизистой оболочки полости рта и глотки.

**Относится к болезням:**

- [Инфекции](#)
- [Лихорадка](#)

**Противопоказания:**

- повышенная чувствительность к любым компонентам препарата;
- аллергические реакции на местные анестетики и хлоргексидин в анамнезе;
- детский возраст до 6 лет;
- фенилкетонурия (препарат содержит аспартам).

**Способ применения и дозы:**

Пастилку рассасывая, но не глотая, держат во рту до полного растворения. Продолжительность приема препарата Дрилл не должна превышать 5 дней. Между приемами препарата необходимо соблюдать интервал не менее 2-х часов. После приема препарата не рекомендуется: принимать пищу и напитки, а также чистить зубы в течение последующих 1-2 ч.

**Взрослым и детям старше 15 лет** по 1 пастилке 4 раза в день. Максимальная суточная доза - 4 пастилки.

**Детям от 6 до 15 лет** - по 1 пастилке 2-3 раза в день. Максимальная суточная доза - 3 пастилки.

**Побочное действие:**

При применении препарата Дрилл по одобренному показанию и в рекомендуемых дозах возможно проявление следующих побочных явлений:

*Нарушения со стороны иммунной системы:* аллергические реакции.

*Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей:* кожные высыпания.

*Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта:* преходящее окрашивание языка и зубов в коричневый цвет; временное онемение языка и глотки.

**Передозировка:**

До настоящего времени о случаях передозировки препарата Дрилл не сообщалось.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

Имеются ограниченные данные по применению препарата Дрилл при беременности и в период грудного вскармливания. Поэтому рекомендуется воздержаться от применения препарата во время беременности и грудного вскармливания.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Клинически значимого взаимодействия препарата Дрилл с лекарственными средствами других групп не выявлено. Тем не менее, не рекомендуется одновременный или последовательный прием препарата Дрилл и других местных антисептиков (особенно веществ анионной природы) из-за вероятности взаимодействия, приводящего, к антагонизму, инактивации и прочим проявлениям такого взаимодействия.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Длительное применение (более 5 дней) препарата нежелательно из-за возможного нарушения нормального состава микрофлоры полости рта и глотки. В случае ухудшения или отсутствия улучшения самочувствия по истечении 5 дней рекомендуется обратиться к врачу.

После приема препарата не рекомендуется: принимать пищу и напитки, чистить зубы в течение последующих 1-2 ч.

Препарат Дрилл следует с особой осторожностью принимать спортсменам в связи с тем, что активные компоненты препарата способны вызывать положительную реакцию в тестах антидопингового контроля.

Окрашивание зубов или композитного пломбировочного материала нестойкое и в значительной мере может быть предупреждено с помощью ежедневной чистки зубов обычной зубной пастой, а в случае зубных протезов - применения традиционных чистящих средств.

Больным сахарным диабетом необходимо учитывать, что 1 пастилка содержит 0,2 хлебные единицы.

Энергетическая ценность 1 пастилки составляет 5,8 ккал.

В случае ухудшения самочувствия или появления необычных реакций, рекомендуется обратиться к врачу.

*Влияние на способность управления транспортными средствами и механизмами*

Препарат Дрилл не влияет на способность управлять автомобилем и другими механическими средствами.

## **Условия хранения:**

В сухом месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Drill>