

## Дриптан



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Оксibuтинин

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Таблетки** белого цвета, круглые, двояковыпуклые, с риской на одной стороне.

	<b>1 таб.</b>
оксibuтинина гидрохлорид	5 мг

*Вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая - 17.8 мг, лактоза - 153.3 мг, кальция стеарат - 1.9 мг.

30 шт. - блистеры (1) - коробки картонные.

30 шт. - блистеры (2) - коробки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Спазмолитик. Оказывает прямое спазмолитическое, миотропное и м-холиноблокирующее действие. Расслабляет детрузор, увеличивает вместимость мочевого пузыря, снижает частоту сокращений детрузора, сдерживает позывы к мочеиспусканию.

#### Фармакокинетика

После приема препарата внутрь  $C_{max}$  достигается через 45 мин, величина концентрации пропорциональна применяемой дозе.  $T_{1/2}$  составляет 2 ч.

У лиц пожилого возраста  $T_{1/2}$  увеличивается.

### Показания к применению:

Недержание мочи, связанное с нестабильностью функции мочевого пузыря, вызванной:

— нейрогенными расстройствами (гиперрефлекс детрузора), например при распространенном склерозе или spina bifida;

— идиопатическими нарушениями функции детрузора.

Ночной энурез (у детей старше 5 лет).

## Относится к болезням:

- [Склерит](#)

## Противопоказания:

- закрытоугольная глаукома;
- обструкция ЖКТ;
- атония кишечника;
- расширение ободочной кишки;
- язвенный колит;
- миастения;
- обструктивная уропатия;
- кровотечение;
- период лактации (грудного вскармливания);
- детский возраст до 5 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

**Взрослым** препарат назначают по 5 мг 2-3 раза/сут.

**Детям и лицам пожилого возраста** рекомендованная доза составляет 5 мг 2 раза/сут.

## Побочное действие:

*Со стороны пищеварительной системы:* тошнота, запор, диарея, сухость во рту, дискомфорт в абдоминальной области.

*Со стороны ЦНС:* сонливость, бессонница, общая слабость, головная боль, головокружение.

*Со стороны органа зрения:* нарушения зрения (мидриаз, паралич аккомодации), повышение внутриглазного давления.

*Прочие:* задержка мочеиспускания, аритмии, снижение потоотделения, импотенция, аллергические реакции.

## Передозировка:

*Симптомы:* беспокойство, тремор, повышенная нервная возбудимость, судороги, бред, галлюцинации, лихорадка, тошнота, рвота, тахикардия, снижение АД, дыхательная недостаточность, паралич, кома.

*Лечение:* искусственная рвота, промывание желудка, прием активированного угля или солевых слабительных средств, при необходимости следует поддерживать дыхание. Для регрессии симптомов антихолинергической интоксикации используют блокаторы холинэстеразы (физостигмин); при выраженном беспокойстве или возбуждении в/в вводят 10 мг диазепама; при тахикардии – в/в пропранолол.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности Дриптан назначают только по строгим показаниям.

## **Дриптан**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

При необходимости применения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Данные по лекарственному взаимодействию препарата Дриптан не предоставлены.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

С осторожностью применяют препарат при нарушении функции печени и почек, гипертиреозе, ИБС, сердечной недостаточности, аритмии, артериальной гипертензии, доброкачественной гиперплазии предстательной железы, грыже пищеводного отверстия диафрагмы.

#### ***При нарушениях функции почек***

С осторожностью применяют препарат при нарушении функции почек

#### ***При нарушениях функции печени***

С осторожностью применяют препарат при нарушении функции печени

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C. Срок годности – 3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Driptan>