Дриптан



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Оксибутинин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Таблетки белого цвета, круглые, двояковыпуклые, с риской на одной стороне.

	1 таб.
оксибутинина гидрохлорид	5 мг

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 17.8 мг, лактоза - 153.3 мг, кальция стеарат - 1.9 мг.

30 шт. - блистеры (1) - коробки картонные.
30 шт. - блистеры (2) - коробки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Спазмолитик. Оказывает прямое спазмолитическое, миотропное и м-холиноблокирующее действие. Расслабляет детрузор, увеличивает вместимость мочевого пузыря, снижает частоту сокращений детрузора, сдерживает позывы к мочеиспусканию.

Фармакокинетика

После приема препарата внутрь C_{max} достигается через 45 мин, величина концентрации пропорциональна применяемой дозе. $T_{1/2}$ составляет 2 ч.

У лиц пожилого возраста $T_{1/2}$ увеличивается.

Показания к применению:

Недержание мочи, связанное с нестабильностью функции мочевого пузыря, вызванной:

— нейрогенными расстройствами (гиперрефлекс детрузора), например при распространенном склерозе или spina bifida;

— идиопатическими нарушениями функции детрузора.

Ночной энурез (у детей старше 5 лет).

Относится к болезням:

- Склерит

Противопоказания:

— закрытоугольная глаукома;

— обструкция ЖКТ;

— атония кишечника;

— расширение ободочной кишки;

— язвенный колит;

— миастения;

— обструктивная уропатия;

— кровотечение;

— период лактации (грудного вскармливания);

— детский возраст до 5 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым препарат назначают по 5 мг 2-3 раза/сут.

Детям и лицам пожилого возраста рекомендованная доза составляет 5 мг 2 раза/сут.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, запор, диарея, сухость во рту, дискомфорт в абдоминальной области.

Со стороны ЦНС: сонливость, бессонница, общая слабость, головная боль, головокружение.

Со стороны органа зрения: нарушения зрения (мидриаз, паралич аккомодации), повышение внутриглазного давления.

Прочие: задержка мочеиспускания, аритмии, снижение потоотделения, импотенция, аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: беспокойство, тремор, повышенная нервная возбудимость, судороги, бред, галлюцинации, лихорадка, тошнота, рвота, тахикардия, снижение АД, дыхательная недостаточность, паралич, кома.

Лечение: искусственная рвота, промывание желудка, прием активированного угля или солевых слабительных средств, при необходимости следует поддерживать дыхание. Для регрессии симптомов антихолинергической интоксикации используют блокаторы холинэстеразы (физостигмин); при выраженном беспокойстве или возбуждении в/в вводят 10 мг диазепама; при тахикардии – в/в пропранолол.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности Дриптан назначают только по строгим показаниям.

При необходимости применения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные по лекарственному взаимодействию препарата Дриптан не предоставлены.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью применяют препарат при нарушении функции печени и почек, гипертиреозе, ИБС, сердечной недостаточности, аритмии, артериальной гипертензии, доброкачественной гиперплазии предстательной железы, грыже пищеводного отверстия диафрагмы.

При нарушениях функции почек

С осторожностью применяют препарат при нарушении функции почек

При нарушениях функции печени

С осторожностью применяют препарат при нарушении функции печени

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°С. Срок годности – 3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Driptan