

[Дротаверин-Солофарм](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Раствор для в/в и в/м введения от светло-желтого или зеленовато-желтоватого до желтого зеленовато-желтого цвета, прозрачный или слабо опалесцирующий.

| | |
|-------------------------|-------------|
| | 1 мл |
| дротаверина гидрохлорид | 20 мг |

Вспомогательные вещества: этанол 95% - 67 мг, натрия дисульфит - 1 мг, вода д/и - до 1 мл.

- 2 мл - ампулы стеклянные (5) - упаковки контурные ячейковые (1) - пачки картонные.
- 2 мл - ампулы стеклянные (5) - упаковки контурные ячейковые (2) - пачки картонные.
- 2 мл - ампулы стеклянные (5) - упаковки контурные ячейковые (10) - пачки картонные.
- 2 мл - ампулы стеклянные (5) - упаковки контурные ячейковые (20) - пачки картонные.
- 2 мл - ампулы стеклянные (10) - упаковки контурные ячейковые (1) - пачки картонные.
- 2 мл - ампулы стеклянные (10) - упаковки контурные ячейковые (5) - пачки картонные.
- 2 мл - ампулы стеклянные (10) - упаковки контурные ячейковые (10) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Спазмолитик миотропного действия. По химической структуре и фармакологическим свойствам близок к папаверину, однако превосходит его по эффективности и продолжительности действия. Снижает тонус гладких мышц внутренних органов, снижает их двигательную активность. Оказывает вазодилатирующее действие.

Фармакокинетика

После приема внутрь дротаверин быстро абсорбируется из ЖКТ. Биодоступность - около 100%. Не проникает через ГЭБ.

Показания к применению:

Профилактика и лечение функциональных нарушений и болевого синдрома, вызванных спазмом гладкой мускулатуры (в т.ч. спазмы ЖКТ, мочевыводящих путей, связанные с холелитиазом, холециститом, язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки; спазм пилорического и кардиального отдела желудка; спастические запоры, спастический колит; проктит, тенезмы; послеоперационные колики вследствие задержки газов; в связи с нефролитиазом, пиелитом); при проведении инструментальных исследований; спазмы периферических артерий,

сосудов головного мозга; альгодисменорея.

Для снижения возбудимости матки при беременности; при спазме зева матки в родах, затяжном раскрытии зева, послеродовых схватках, угрожающем аборте.

Относится к болезням:

- [Альгодисменорея](#)
- [Запор](#)
- [Кардит](#)
- [Колит](#)
- [Нефрит](#)
- [Нефролитиаз](#)
- [Пиелит](#)
- [Проктит](#)
- [Спазмы](#)
- [Холера](#)
- [Холецистит](#)
- [Язвенная болезнь](#)

Противопоказания:

Почечная недостаточность тяжелой степени, тяжелая печеночная недостаточность, тяжелая сердечная недостаточность (синдром низкого сердечного выброса), период лактации (грудного вскармливания), детский возраст (для парентерального применения), повышенная чувствительность к дротаверину.

Способ применения и дозы:

Внутрь, в/м, в/в или п/к взрослым - по 40-80 мг 1-3 раза/сут. При печеночной и почечной коликах рекомендуется вводить в/в медленно в дозе 40-80 мг.

При спазмах периферических артерий дротаверин можно вводить в/а.

Для детей в возрасте до 6 лет при приеме внутрь разовая доза составляет 10-20 мг, 6-12 лет - 20 мг, частота применения 1-2 раза/сут.

Побочное действие:

Со стороны сердечно-сосудистой системы: сердцебиение, чувство жара; при в/в введении отмечены случаи снижения АД (вплоть до коллапса), развития AV-блокады, появления аритмий.

Со стороны дыхательной системы: при в/в введении отмечены случаи угнетения дыхательного центра.

Прочие: головокружение, усиление потоотделения.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью применяют при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с трициклическими антидепрессантами, хинидином, прокаиномидом усиливается снижение АД, вызываемое трициклическими антидепрессантами, хинидином и прокаиномидом.

При одновременном применении уменьшается спазмогенная активность морфина.

При одновременном применении с леводопой возможно уменьшение антипаркинсонического эффекта леводопы.

При одновременном применении усиливается действие папаверина, бендазола и других спазмолитиков (в т.ч. м-холиноблокаторов).

При одновременном применении с фенотербалом повышается выраженность спазмолитического действия

дротаверина.

Особые указания и меры предосторожности:

Диагнозы

- Аллергический дерматит у детей
- Коклюш
- Круп
- Лечение и профилактика недержания мочи у детей

Источник: <http://drugs.thead.ru/Drotaverin-Solofarm>