

## Дуоденохель



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

♦ **Таблетки для рассасывания гомеопатические** от белого до желтовато-белого цвета, иногда с желтоватыми или сероватыми вкраплениями, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской; без запаха.

	<b>1 таб.</b>
Semecarpus anacardium (семякарпус анакардиум) D4	30 мг
Argentum nitricum (аргентум нитрикум) D6	30 мг
Ipecacuanha (ипекакуана) D4	30 мг
Iodum (йодум) D6	30 мг
Lachesis mutus (лахезис мутус) D12	60 мг
Petroleum rectificatum (петролеум ректификатум) D6	60 мг
Robinia pseudoacacia (робиния псеудоакация) D4	60 мг

*Вспомогательные вещества:* магния стеарат, лактоза.

50 шт. - пеналы полипропиленовые (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Гомеопатическое средство.

### Показания к применению:

В комплексной терапии:

- язвенной болезни двенадцатиперстной кишки;
- гастродуоденита;
- гастрита с повышенной кислотностью.

### Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Гастродуоденит](#)

- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки](#)

### Противопоказания:

- заболевания щитовидной железы;
- беременность;
- период лактации;
- детский возраст до 4-х лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата, в частности, к йоду.

В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности.

### Способ применения и дозы:

По 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком за полчаса до еды или спустя 1 час после приема пищи. При обострениях принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более двух часов.

Курс лечения - 3-4 недели. При необходимости курс лечения можно повторить после консультации с врачом.

Применение препарата у детей от 4-х лет возможно по назначению и под контролем врача.

### Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано применение при беременности и в период лактации.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

### Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.

При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0.025 ХЕ.

#### **Применение в детском возрасте**

Применение препарата у детей от 4-х лет возможно по назначению и под контролем врача.

### Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 15°C до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте! Не применять по истечении срока годности.

## **Дуоденохель**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

### **Срок годности:**

5 лет.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Duodenohe>