Дюспаталин (таблетки)



Код АТХ:

- A03AA04

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Мебеверин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Спазмолитик миотропного действия. Понижает тонус и уменьшает сократительную активность гладкой мускулатуры ЖКТ (главным образом, толстого кишечника).

Фармакокинетика

При приеме внутрь подвергается пресистемному гидролизу и не обнаруживается в плазме. Метаболизируется в печени до вератровой кислоты и мебеверинового спирта. Выводится главным образом почками в виде метаболитов, в небольших количествах – желчью (полностью - в течение 24 ч).

Показания к применению:

Спастические состояния ЖКТ, обусловленные органическими заболеваниями. Симптоматическое лечение болей,

спастических состояний, неприятных ощущений при синдроме раздраженного кишечника.

Противопоказания:

Беременность, повышенная чувствительность к мебеверину.

Способ применения и дозы:

Принимают внутрь по 100 мг 4 раза или по 135 мг 3 раза/сут. При достижении желаемого клинического эффекта дозу постепенно снижают в течение нескольких недель.

Побочное действие:

Возможно: тошнота, аллергические реакции, головокружение, головная боль, диарея, запор.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Мебеверин противопоказан к применению при беременности.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения необходимо воздерживаться от вождения автотранспорта и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Источник: http://drugs.thead.ru/Dyuspatalin_tabletki