

[Дюспаталин \(таблетки\)](#)



Код АТХ:

- [A03AA04](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Мебеверин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Спазмолитик миотропного действия. Понижает тонус и уменьшает сократительную активность гладкой мускулатуры ЖКТ (главным образом, толстого кишечника).

Фармакокинетика

При приеме внутрь подвергается пресистемному гидролизу и не обнаруживается в плазме. Метаболизируется в печени до вератровой кислоты и мебеверинового спирта. Выводится главным образом почками в виде метаболитов, в небольших количествах – желчью (полностью - в течение 24 ч).

Показания к применению:

Спастические состояния ЖКТ, обусловленные органическими заболеваниями. Симптоматическое лечение болей,

Дюспаталин (таблетки)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

спастических состояний, неприятных ощущений при синдроме раздраженного кишечника.

Противопоказания:

Беременность, повышенная чувствительность к мебеверину.

Способ применения и дозы:

Принимают внутрь по 100 мг 4 раза или по 135 мг 3 раза/сут. При достижении желаемого клинического эффекта дозу постепенно снижают в течение нескольких недель.

Побочное действие:

Возможно: тошнота, аллергические реакции, головокружение, головная боль, диарея, запор.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Мебеверин противопоказан к применению при беременности.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения необходимо воздерживаться от вождения автотранспорта и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Источник: http://drugs.thead.ru/Dyuspatalin_tabletki