Эбастин



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Таблетки, диспергируемые в полости рта*** белые или почти белые, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской.

	1 таб.
эбастин	20 мг

Вспомогательные вещества: маннитол - 129 мг, кросповидон - 50 мг, кремния диоксид (силоид) - 5 мг, магния стеарат - 3 мг, ароматизатор мяты перечной - 2 мг, аспартам - 1 мг.

10 шт. - блистеры Ал/Ал (3) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Блокатор гистаминовых H_1-рецепторов из группы производных пиперидина. Оказывает противоаллергическое действие. Характеризуется продолжительным действием (до 48 ч), что обусловлено образованием активных метаболитов. В отличие от многих блокаторов гистаминовых H_1-рецепторов эбастин практически не обладает м-холиноблокирующей активностью, а также плохо проникает в ЦНС и не оказывает выраженного седативного действия.

Фармакокинетика

Абсорбция составляет 90-95%. Метаболизируется в печени, превращаясь в активный метаболит каребастин. Жирная пища ускоряет абсорбцию (концентрация в крови возрастает в 1.5 раза) и пресистемный метаболизм (образование каребастина). C_{max} после однократного приема 10 мг достигается через 2.6-4 ч и составляет 80-100 нг/мл. C_{ss} достигается через 3-5 дней и составляет 130-160 нг/мл. Связывание с белками плазмы эбастина и каребастина - 95%. $T_{1/2}$ каребастина - 15-19 ч, выводится почками - 60-70% в виде конъюгатов. При почечной недостаточности $T_{1/2}$ возрастает до 23-26 ч, при печеночной недостаточности - до 27 ч.

Показания к применению:

Аллергический ринит, аллергический конъюнктивит, крапивница.

Относится к болезням:

- Аллергия
- Конъюнктивит
- Крапивница
- Ринит

Противопоказания:

Беременность, период лактации, повышенная чувствительность к производным пиперидина.

Способ применения и дозы:

При приеме внутрь разовая доза для взрослых составляет 10 мг, частота приема - 1 раз/сут.

Побочное действие:

Возможно: головная боль, сухость во рту, сонливость.

Редко: абдоминальные боли, диспепсия, тошнота, астенический синдром, сонливость, бессонница, ринит, синусит.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Диагнозы

- Анафилактический шок
- Отек Квинке
- Сенная лихорадка

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Эбастин не рекомендуется применять одновременно с эритромицином и кетоконазолом (увеличение риска развития удлинения интервала QT).

Эбастин совместим с теофиллином, непрямыми антикоагулянтами, циметидином, диазепамом, этанолом и этанолсодержащими препаратами.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью применяют у пациентов с нарушениями функции печени и почек (в этих случаях значительно увеличивается $T_{1/2}$ эбастина).

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В терапевтических дозах не влияет на способность к вождению автомобиля и к управлению механизмами.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ebastin