

[Эхинацеи настойка \(настойка\)](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Эхинацеи пурпурной травы настойка](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения. Травя эхинацеи пурпурной содержит водорастворимые иммуностимулирующие полисахариды (4-О-метилглюкуроиларабиноксиланы, кислые арабинорамно-галактаны); эфирные масла (компоненты включают гермакрин алкоголь, борнеол, борнилацетат, пентадека-8-ен-2-он, гермакрин D, кариофиллин, кариофиллин эпоксид); флавоноиды (феруловая кислота ее производные, включая цикориевую кислоту, метиловый эфир цикориевой кислоты, 2-О-кофеил-3-О-ферулоил-тартариковая кислота, 2,3-О-диферулоил тартариковая кислота, 2-О-кофеил тартариковая кислота); алкамиды; полиены.

Оказывает иммуномодулирующий, противовоспалительный эффекты. Полисахариды повышают фагоцитарную активность нейтрофилов и макрофагов, стимулируют продукцию интерлейкина-1. Комплекс действующих веществ индуцирует трансформацию В-лимфоцитов в плазматические клетки, улучшает функции Т-хелперов. Благодаря инулину, левулезе, бетаину улучшает обменные процессы, особенно в печени и почках.

Показания к применению:

Повышение неспецифических факторов защиты организма при неосложненных острых инфекционных заболеваниях и при предрасположенности к частым простудным заболеваниям; в целях стимуляции иммунитета у пациентов с неосложненными острыми инфекционными заболеваниями (в качестве вспомогательного лечения); профилактика ОРВИ и гриппа; в качестве вспомогательного лекарственного средства при продолжительной антибиотикотерапии хронических инфекционных заболеваний.

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)

Противопоказания:

Туберкулез, лейкозы, аутоиммунные заболевания (в т.ч. коллагенозы), распространенный атеросклероз, рассеянный склероз, СПИД, ВИЧ-инфекция, детский возраст до 4 лет (для лекарственной формы - таблетки), и до 1 года (для лекарственной формы - капли), повышенная чувствительность к эхинацее и растениям семейства сложноцветных.

Способ применения и дозы:

Препараты эхинацеи принимают внутрь. Доза, частота и длительность применения устанавливаются индивидуально, в зависимости от используемой лекарственной формы.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции; при применении в высоких дозах - тошнота, рвота, нарушения стула, бессонница, повышенная возбудимость нервной системы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не следует применять при беременности.

Особые указания и меры предосторожности:

Пациентам с рецидивирующими инфекционными заболеваниями дыхательных путей требуется регулярный медицинский контроль.

В период применения эхинацеи не следует назначать другие иммуностимулирующие препараты.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 4 лет (для лекарственной формы - таблетки), и до 1 года (для лекарственной формы - капли).

Источник: http://drugs.thead.ru/Ehinacei_Nastoyka_nastoyka