

Эхинацея (таблетки)



Код АТХ:

- [L03AX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Эхинацеи узколистной экстракт](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки для рассасывания** круглые, плоскоцилиндрические, с фаской, светло-коричневого цвета, со светлыми или темными вкраплениями, с характерным запахом, с гравировкой "NP" на фоне изображения дерева.

	1 таб.
экстракт эхинацеи узколистной	200 мг

10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Иммунотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Повышает устойчивость организма к вирусным, бактериальным и грибковым инфекциям. Неспецифическая резистентность повышается, активируются макрофаги и гранулоциты, усиливается фагоцитоз. Высвобождение цитокинов приводит к пролиферации и стимуляции иммунокомпетентных клеток. Содержание пропердина в сыворотке крови увеличивается.

У некоторых веществ, содержащихся в экстракте Эхинацеи, обнаружена противовирусная активность в отношении вирусов гриппа и герпеса, а также ингибирующее действие на тканевую и бактериальную гиалуронидазу.

Показания к применению:

- профилактика ОРВИ и ОРЗ;
- начальные признаки гриппа и простуды (в комплексной терапии);
- в качестве вспомогательного средства при рецидивирующих инфекциях дыхательных и мочевыводящих путей.

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность к Эхинацее пурпурной, к другим растениям семейства сложноцветных (ромашка, арника, золотая маргаритка, бархатцы), а также к любым другим ингредиентам препарата;
- системные заболевания соединительной ткани, прогрессирующие системные заболевания, такие как туберкулез, лейкозы, распространенный атеросклероз;
- рассеянный склероз, аутоиммунные заболевания;
- СПИД, ВИЧ-инфекция;
- детский возраст (до 12 лет).

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 12 лет - по 1 таб. 3-4 раза/сут.

Таблетки необходимо держать во рту до полного рассасывания.

Для достижения хорошего результата препарат следует принимать не менее 1 недели.

Препарат не следует принимать длительное время (более 8 недель).

Побочное действие:

Аллергические реакции: кожные высыпания, зуд, отек лица, затруднение дыхания, головокружение, снижение АД. При развитии гиперчувствительности прием таблеток необходимо прекратить.

Передозировка:

Является безопасным препаратом. До настоящего времени не было сообщений о случаях интоксикации у человека.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не следует назначать в течение беременности и периода лактации, поскольку безопасность препарата в этих ситуациях не изучена.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

До настоящего времени не было сообщений о взаимодействиях препарата с другими лекарственными средствами.

Эхинацея (таблетки)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Поскольку Эхинацея обладает иммуностимулирующим действием, одновременное применение с иммунодепрессантами и ГКС может ослабить их эффект, а одновременное использование препарата с цитокинами может усилить их эффект.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат не следует принимать длительное время (более 8 недель).

Не следует превышать рекомендуемые дозы препарата.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям до 12 лет.

Условия хранения:

В защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

Не использовать позже срока, указанного на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ehinaceya_tabletki