Экларан 5



Код АТХ:

- D01AE01

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Бензоила пероксид

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства
- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противомикробное средство для наружного применения. Оказывает противомикробное действие. Активен в отношении грамположительных бактерий: Propionibacterium, Staphylococcus epidermidis.

Обладает кератолитическим действием, улучшает оксигенацию тканей, процесс грануляции язв нижних конечностей. Снижает образование жира сальными железами кожи.

Фармакокинетика

При наружном применении практически не всасывается. Небольшое количество абсорбируется кожей. Метаболизируется с образованием бензойной кислоты. Выводится почками в виде бензоата.

Показания к применению:

Вульгарные угри (в т.ч. сливные угри - в составе комплексной терапии).

Язвы голеней различного генеза (в т.ч. трофические).

Относится к болезням:

- Угри

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к бензоил пероксиду.

Способ применения и дозы:

Применяют наружно. Для лечения угревой сыпи наносят в виде 5% геля на пораженные участки кожи 1 раз/сут в течение 2-3 нед., затем переходят на 10% гель, который применяют вплоть до исчезновения кожных проявлений.

При лечении язв голеней применяют 10% гель с наложением окклюзионной повязки 2 раза/сут в течение 2-3 нед. Лосьон применяют для промывания пораженных участков 1-2 раза в сутки до исчезновения симптомов.

Побочное действие:

Местные реакции: гиперемия кожи, аллергические реакции, сухость кожи, местнораздражающее действие.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью следует применять при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью применять у детей в возрасте до 12 лет.

Следует избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки.

Применение в детском возрасте

С осторожностью применять у детей в возрасте до 12 лет.

Источник: http://drugs.thead.ru/Eklaran_5