

## [Экларан 5](#)



### **Код АТХ:**

- [D01AE01](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Бензоила пероксид](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Органотропные средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Противомикробное средство для наружного применения. Оказывает противомикробное действие. Активен в отношении грамположительных бактерий: *Propionibacterium*, *Staphylococcus epidermidis*.

Обладает кератолитическим действием, улучшает оксигенацию тканей, процесс грануляции язв нижних конечностей. Снижает образование жира сальными железами кожи.

#### **Фармакокинетика**

При наружном применении практически не всасывается. Небольшое количество абсорбируется кожей. Метаболизируется с образованием бензойной кислоты. Выводится почками в виде бензоата.

### **Показания к применению:**

Вульгарные угри (в т.ч. сливные угри - в составе комплексной терапии).

Язвы голеней различного генеза (в т.ч. трофические).

### **Относится к болезням:**

- [Угри](#)

## **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к бензоил пероксиду.

## **Способ применения и дозы:**

Применяют наружно. Для лечения угревой сыпи наносят в виде 5% геля на пораженные участки кожи 1 раз/сут в течение 2-3 нед., затем переходят на 10% гель, который применяют вплоть до исчезновения кожных проявлений.

При лечении язв голеней применяют 10% гель с наложением окклюзионной повязки 2 раза/сут в течение 2-3 нед. Лосьон применяют для промывания пораженных участков 1-2 раза в сутки до исчезновения симптомов.

## **Побочное действие:**

*Местные реакции:* гиперемия кожи, аллергические реакции, сухость кожи, местнораздражающее действие.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

С осторожностью следует применять при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## **Особые указания и меры предосторожности:**

С осторожностью применять у детей в возрасте до 12 лет.

Следует избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки.

### ***Применение в детском возрасте***

С осторожностью применять у детей в возрасте до 12 лет.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Ekklaran\\_5](http://drugs.thead.ru/Ekklaran_5)