

## Экобол



### Код АТХ:

- [J01CA04](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Амоксициллин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

#### Форма выпуска, описание и состав

**Таблетки** белого или почти белого цвета, капсуловидные, с риской.

	<b>1 таб.</b>
амоксициллин (в форме тригидрата)	250 мг

*Вспомогательные вещества:* лактулоза - 300 мг, повидон низкомолекулярный - 5 мг, кросповидон (коллидон CL-M) - 25 мг, кроскармеллоза натрия - 35 мг, тальк - 14 мг, магния стеарат - 7 мг, крахмал картофельный - до 700 мг.

- 5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
- 5 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
- 20 шт. - флаконы пластиковые (1) - пачки картонные.
- 20 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

**Таблетки** белого или почти белого цвета, капсуловидные, с риской.

	<b>1 таб.</b>
амоксициллин (в форме тригидрата)	500 мг

*Вспомогательные вещества:* лактулоза - 600 мг, повидон низкомолекулярный - 10 мг, кросповидон (коллидон CL-M) - 50 мг, кроскармеллоза натрия - 70 мг, тальк - 28 мг, магния стеарат - 14 мг, крахмал картофельный - до 1400 мг.

- 5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
- 5 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
- 20 шт. - флаконы пластиковые (1) - пачки картонные.
- 20 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

## **Фармакологические свойства:**

Фармакологическое действие — антибактериальное широкого спектра.

## **Показания к применению:**

Бактериальные инфекции, вызванные чувствительной микрофлорой:

- инфекции дыхательных путей и ЛОР-органов (синусит, фарингит, тонзиллит, острый средний отит; бронхит, пневмония);
- инфекции мочеполовой системы (пиелонефрит, пиелит, цистит, уретрит, гонорея, эндометрит, цервицит);
- инфекции ЖКТ (энтероколит, брюшной тиф, холангит, холецистит);
- инфекции кожи и мягких тканей (рожа, импетиго, вторично инфицированные дерматозы);
- лептоспироз;
- листериоз;
- болезнь Лайма (боррелиоз);
- дизентерия;
- сальмонеллез, сальмонеллоносительство;
- эндокардит (профилактика).

## **Относится к болезням:**

- [Бронхит](#)
- [Брюшной тиф](#)
- [Гонорея](#)
- [Дерматит](#)
- [Дизентерия](#)
- [Импетиго](#)
- [Инфекции](#)
- [Инфекции ЖКТ](#)
- [Лептоспироз](#)
- [Листериоз](#)
- [Отит](#)
- [Пиелит](#)
- [Пиелонефрит](#)
- [Пневмония](#)
- [Рожа](#)
- [Сальмонеллез](#)
- [Синусит](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Уретрит](#)
- [Фарингит](#)
- [Холангит](#)
- [Холера](#)
- [Холецистит](#)
- [Цервицит](#)
- [Цистит](#)
- [Эндокардит](#)
- [Эндометрит](#)
- [Энтерит](#)

## **Противопоказания:**

- гиперчувствительность (в т.ч. к другим пенициллинам, цефалоспорином, карбапенемам);
- детский возраст до 3 лет (для данной лекарственной формы).

С *осторожностью* следует назначать препарат при аллергических заболеваниях (в т.ч. в анамнезе), заболеваниях

ЖКТ в анамнезе (особенно колите, связанном с применением антибиотиков), почечной недостаточности, тяжелых нарушениях функции печени, беременности, в период лактации, инфекционном мононуклеозе, лимфолейкозе.

## Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь, до или после приема пищи.

**Взрослым и детям старше 10 лет (с массой тела более 40 кг)** назначают 0.5 г 3 раза/сут; при тяжелом течении инфекции - 0.75-1.0 г 3 раза/сут.

**Детям в возрасте 5-10 лет** назначают по 0.25 г 3 раза/сут; **детям в возрасте 3-5 лет** - 0.125 г 3 раза/сут; при тяжелом течении инфекции - 60 мг/кг/сут в 3 приема (максимальная суточная доза).

Курс лечения составляет 5-12 дней.

При *острой неосложненной гонорее* назначают 3 г однократно; при лечении женщин рекомендуется повторный прием указанной дозы.

При *острых инфекционных заболеваниях ЖКТ (паратифы, брюшной тиф) и желчных путей, при гинекологических инфекционных заболеваниях* **взрослым** назначают 1.5-2 г 3 раза/сут или 1-1.5 г 4 раза/сут.

При *лептоспирозе* **взрослым** назначают 0.5-0.75 г 4 раза/сут в течение 6-12 дней.

При *сальмонеллоносительстве* **взрослым** назначают 1.5-2 г 3 раза/сут в течение 2-4 недель.

Для профилактики эндокардита при *малых хирургических вмешательствах* **взрослым** назначают 3-4 г за 1 ч до проведения процедуры. При необходимости назначают повторную дозу через 8-9 ч. У **детей** дозу уменьшают вдвое.

У **пациентов с нарушением функции почек при КК 15-40 мл/мин** интервал между приемами увеличивают до 12 ч; при **КК ниже 10 мл/мин** дозу уменьшают на 15-50%; при **анурии** максимальная доза - 2 г/сут.

## Побочное действие:

*Аллергические реакции:* возможны крапивница, гиперемия кожи, эритема, ангионевротический отек, ринит, конъюнктивит; редко - лихорадка, боли в суставах, эозинофилия, эксфолиативный дерматит, многоформная экссудативная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, реакции, сходные с сывороточной болезнью; в единичных случаях - анафилактический шок.

*Со стороны пищеварительной системы:* дисбактериоз, изменение вкуса, рвота, тошнота, диарея, стоматит, глоссит, нарушение функции печени, умеренное повышение активности печеночных трансаминаз, псевдомембранозный энтероколит.

*Со стороны нервной системы:* возбуждение, тревожность, бессонница, атаксия, спутанность сознания, изменение поведения, депрессия, периферическая невропатия, головная боль, головокружение, судорожные реакции.

*Со стороны лабораторных показателей:* лейкопения, нейтропения, тромбоцитопеническая пурпура, анемия.

*Прочие:* затрудненное дыхание, тахикардия, интерстициальный нефрит, кандидоз влагалища, суперинфекция (особенно у пациентов с хроническими заболеваниями или пониженной резистентностью организма).

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Ekobol>