Экобол



Код АТХ:

- J01CA04

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Амоксициллин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Таблетки белого или почти белого цвета, капсуловидные, с риской.

	1 таб.
амоксициллин (в форме тригидрата)	250 мг

Вспомогательные вещества: лактулоза - 300 мг, повидон низкомолекулярный - 5 мг, кросповидон (коллидон CL-M) - 25 мг, кроскармеллоза натрия - 35 мг, тальк - 14 мг, магния стеарат - 7 мг, крахмал картофельный - до 700 мг.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
5 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
20 шт. - флаконы пластиковые (1) - пачки картонные.
20 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

Таблетки белого или почти белого цвета, капсуловидные, с риской.

	1 таб.
амоксициллин (в форме тригидрата)	500 мг

Вспомогательные вещества: лактулоза - 600 мг, повидон низкомолекулярный - 10 мг, кросповидон (коллидон CL-M) - 50 мг, кроскармеллоза натрия - 70 мг, тальк - 28 мг, магния стеарат - 14 мг, крахмал картофельный - до 1400 мг.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
5 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
20 шт. - флаконы пластиковые (1) - пачки картонные.
20 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — антибактериальное широкого спектра.

Показания к применению:

Бактериальные инфекции, вызванные чувствительной микрофлорой:

— инфекции дыхательных путей и ЛОР-органов (синусит, фарингит, тонзиллит, острый средний отит; бронхит, пневмония);

— инфекции мочеполовой системы (пиелонефрит, пиелит, цистит, уретрит, гонорея, эндометрит, цервицит);

— инфекции ЖКТ (энтероколит, брюшной тиф, холангит, холецистит);

— инфекции кожи и мягких тканей (рожа, импетиго, вторично инфицированные дерматозы);

— лептоспироз;

— листериоз;

— болезнь Лайма (боррелиоз);

— дизентерия;

— сальмонеллез, сальмонеллоносительство;

— эндокардит (профилактика).

Относится к болезням:

- Бронхит
- Брюшной тиф
- Гонорея
- Дерматит
- Дизентерия
- Импетиго
- Инфекции
- Инфекции ЖКТ
- Лептоспироз
- Листериоз
- Отит
- Пиелит
- Пиелонефрит
- Пневмония
- Рожа
- Сальмонеллез
- Синусит
- Тонзиллит
- Уретрит
- Фарингит
- Холангит
- Холера
- Холецистит
- Цервицит
- Цистит
- Эндокардит
- Эндометрит
- Энтерит

Противопоказания:

— гиперчувствительность (в т.ч. к другим пенициллинам, цефалоспоринам, карбапенемам);

— детский возраст до 3 лет (для данной лекарственной формы).

С *осторожностью* следует назначать препарат при аллергических заболеваниях (в т.ч. в анамнезе), заболеваниях

ЖКТ в анамнезе (особенно колите, связанном с применением антибиотиков), почечной недостаточности, тяжелых нарушениях функции печени, беременности, в период лактации, инфекционном мононуклеозе, лимфолейкозе.

Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь, до или после приема пищи.

Взрослым и детям старше 10 лет (с массой тела более 40 кг) назначают 0.5 г 3 раза/сут; при тяжелом течении инфекции - 0.75-1.0 г 3 раза/сут.

Детям в возрасте 5-10 лет назначают по 0.25 г 3 раза/сут; **детям в возрасте 3-5 лет** - 0.125 г 3 раза/сут; при тяжелом течении инфекции - 60 мг/кг/сут в 3 приема (максимальная суточная доза).

Курс лечения составляет 5-12 дней.

При *острой неосложненной гонорее* назначают 3 г однократно; при лечении женщин рекомендуется повторный прием указанной дозы.

При *острых инфекционных заболеваниях ЖКТ (паратифы, брюшной тиф) и желчных путей*, при *гинекологических инфекционных заболеваниях* **взрослым** назначают 1.5-2 г 3 раза/сут или 1-1.5 г 4 раза/сут.

При *лептоспирозе* **взрослым** назначают 0.5-0.75 г 4 раза/сут в течение 6-12 дней.

При *сальмонеллоносительстве* **взрослым** назначают 1.5-2 г 3 раза/сут в течение 2-4 недель.

Для *профилактики эндокардита при малых хирургических вмешательствах* **взрослым** назначают 3-4 г за 1 ч до проведения процедуры. При необходимости назначают повторную дозу через 8-9 ч. У **детей** дозу уменьшают вдвое.

У **пациентов с нарушением функции почек при КК 15-40 мл/мин** интервал между приемами увеличивают до 12 ч; при **КК ниже 10 мл/мин** дозу уменьшают на 15-50%; при **анурии** максимальная доза - 2 г/сут.

Побочное действие:

Аллергические реакции: возможны крапивница, гиперемия кожи, эритема, ангионевротический отек, ринит, конъюнктивит; редко - лихорадка, боли в суставах, эозинофилия, эксфолиативный дерматит, многоформная экссудативная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, реакции, сходные с сывороточной болезнью; в единичных случаях - анафилактический шок.

Со стороны пищеварительной системы: дисбактериоз, изменение вкуса, рвота, тошнота, диарея, стоматит, глоссит, нарушение функции печени, умеренное повышение активности печеночных трансаминаз, псевдомембранозный энтероколит.

Со стороны нервной системы: возбуждение, тревожность, бессонница, атаксия, спутанность сознания, изменение поведения, депрессия, периферическая невропатия, головная боль, головокружение, судорожные реакции.

Со стороны лабораторных показателей: лейкопения, нейтропения, тромбоцитопеническая пурпура, анемия.

Прочие: затрудненное дыхание, тахикардия, интерстициальный нефрит, кандидоз влагалища, суперинфекция (особенно у пациентов с хроническими заболеваниями или пониженной резистентностью организма).

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ekobol