

## [Экодакс](#)



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Эконазол](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Крем для наружного применения 1%** от белого до желтовато-белого цвета, однородный, гомогенный, практически без запаха.

	<b>1 г</b>
эконазола нитрат	10 мг

*Вспомогательные вещества:* натрия гидроксид - 0.9 мг, натрия дигидрофосфата дигидрат - 3.65 мг, фосфорная кислота - 0.02 мг, хлорокрезол - 1 мг, цетомакрогол 1000 - 50 мг, цетостеариловый спирт (цетиловый спирт 60%, стеариловый спирт 40%) - 70 мг, парафин белый мягкий - 150 мг, парафин жидкий - 60 мг, вода очищенная - ск. треб. до 1 г.

- 10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
- 20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
- 10 г - тубы пластиковые ламинированные (1) - пачки картонные.
- 20 г - тубы пластиковые ламинированные (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Эконазол - производное имидазола, противогрибковый препарат широкого спектра действия для местного применения. Оказывает фунгицидное и бактерицидное действие. Тормозит синтез эргостерола, регулирующего проницаемость клеточной стенки микроорганизмов. Активен в отношении дерматофитов, дрожжевых и плесневых грибов:

*Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton tonsurans, Microsporum canis, Microsporum audouini,*

*Microsporum gypseum*, *Candida albicans*, *Torulopsis*, *Rhodotorula*, *Malassezia furfur* (*Pityrosporum orbiculare*), вызывающего отрубевидный лишай, *Corynebacterium*, *Epidermophyton floccosum*, *Aspergillus*, *Cladosporium*, *Scopulariopsis brevicautus* и некоторых грамположительных бактерий (стрептококков, стафилококков и *Nocardia minutissima*). Эффективен в отношении грибов, устойчивых к лечению другими лекарственными средствами. При местном применении вызывает гибель грибов в течение 3 дней, способствует быстрой регрессии жжения и зуда кожных покровов.

#### **Фармакокинетика**

При наружном применении препарат проникает во все слои кожи и ногтевую пластину. Терапевтические концентрации создаются в роговом и других слоях эпидермиса, а также в дерме. При нанесении на кожу системная абсорбция минимальна и практически незначима. Менее 1 % применяемой дозы выводится с каловыми массами - кишечником, и почками.

### **Показания к применению:**

- дерматомикозы кожи волосистой части головы, вызванные дерматофитами, дрожжами, плесневыми грибами, в т.ч. осложненные суперинфекцией грамположительными бактериями;
- эритразма;
- разноцветный лишай;
- кожные инфекции, вызванные грамположительными микроорганизмами.

### **Относится к болезням:**

- [Дерматит](#)
- [Дерматофития](#)
- [Инфекции](#)
- [Лишай](#)
- [Разноцветный лишай](#)
- [Эритразма](#)

### **Противопоказания:**

- повышенная чувствительность к эконазолу и другим компонентам, входящим в состав препарата;
- детский возраст до 18 лет.

Не наносить препарат на участки с повреждением кожных покровов.

### **Способ применения и дозы:**

Наружно.

**Взрослые и дети старше 18 лет:** на пораженный участок кожи наносят крем тонким ровным слоем и втирают до полного впитывания 2 раза в день (утром и вечером).

Длительность применения - 2 недели, при лечении высококератинизированных участков кожи (стоп) - до 1,5 месяцев.

### **Побочное действие:**

Индивидуальная непереносимость эконазола и других компонентов, входящих в состав препарата.

Возможны *местные реакции* в виде жжения, зуда, раздражения и гиперемии кожи, крапивницы, сухости, гипопигментации, атрофии кожи.

### **Передозировка:**

При случайном приеме крема внутрь возможны тошнота, рвота, диарея.

*Лечение:* промывание желудка, прием внутрь активированного угля, проведение симптоматической терапии.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

При беременности (I-II триместр) применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

При назначении препарата в период лактации необходимо прекратить грудное вскармливание.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Данные отсутствуют.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

У больных экземой перед началом лечения необходимо провести противоэксземную терапию. При отсутствии эффекта от проводимой терапии в рекомендованные сроки необходимо верифицировать диагноз. При появлении первых симптомов гиперчувствительности препарат необходимо отменить.

Избегать попадания препарата в глаза, на слизистые оболочки, на открытые раны. В случае развития любых из побочных эффектов при применении препарата следует прекратить его дальнейшее использование и обратиться к врачу.

*Сведения о возможном влиянии лекарственного препарата для медицинского применения на способность управлять транспортными средствами, механизмами*

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими, потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан детям до 18 лет.

## **Условия хранения:**

Хранить при температуре не выше 30° С. Не замораживать. Хранить в местах, недоступных для детей.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Ekodaks>