

Экзодерил



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Нафтифин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Раствор для наружного применения 1%** прозрачный, бесцветный или слегка желтого цвета, с запахом этанола.

	1 мл
Нафтифина гидрохлорид	10 мг

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль - 50 мг, этанол - 400 мг, вода очищенная - 475 мг.

10 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противогрибковый препарат для наружного применения из группы аллиламинов. Механизм действия связан с ингибированием синтеза сквалена-2,3-эпоксидазы, что приводит к снижению образования эргостерола, входящего в состав клеточной стенки гриба.

Препарат активен в отношении дерматофитов *Trichophyton*, *Epidermophyton*, *Microsporum*, дрожжевых (*Candida* spp., *Pityrosporum*), плесневых грибов (*Aspergillus* spp.) и других грибов (*Sporotrix schenckii*). В отношении дерматофитов и аспергилл нафтифин действует фунгицидно. В отношении дрожжевых грибов проявляет фунгицидную и фунгистатическую активность в зависимости от штамма микроорганизма. Препарат оказывает антибактериальное

Экзодерил

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

действие в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, которые могут вызывать вторичные бактериальные инфекции.

Препарат оказывает противовоспалительное действие, которое способствует быстрому исчезновению симптомов воспаления, особенно зуда.

Фармакокинетика

Нафтифин быстро проникает в кожу, создавая устойчивые противогрибковые концентрации в разных ее слоях, возможно его местное применение 1 раз/сут.

Показания к применению:

— грибковые инфекции кожи и кожных складок (*tinea corporis*, *tinea inguinalis*), в т.ч. межпальцевые микозы (*tinea manuum*, *tinea pedum*);

— грибковые инфекции ногтей (онихомикозы);

— кандидозы кожи;

— отрубевидный лишай;

— дерматомикозы (с сопутствующим зудом или без него).

Экзодерил эффективен при лечении микозов, поражающих область кожи с гиперкератозом, а также в зоне роста волос.

Относится к болезням:

- [Дерматит](#)
- [Зуд](#)
- [Инфекции](#)
- [Кератит](#)
- [Лишай](#)
- [Микоз](#)
- [Отрубевидный лишай](#)

Противопоказания:

— беременность (безопасность и эффективность не определена);

— период лактации (безопасность и эффективность не определена);

— повышенная чувствительность к нафтифину или пропиленгликолю.

Противопоказано нанесение препарата на раневую поверхность.

С *осторожностью*: детский возраст (опыт клинического применения ограничен).

Способ применения и дозы:

Экзодерил следует наносить на пораженную поверхность кожи и соседние с ней участки 1 раз/сут, после тщательной очистки и высушивания, захватывая приблизительно 1 см здорового участка кожи по краям зоны поражения.

Длительность лечения при *дерматомикозах* - 2-4 недели (при необходимости - до 8 недель), при *кандидозах* - 4 недели.

При *онихомикозах* перед первым применением раствора необходимо максимально удалить пораженную часть ногтя ножницами и пилкой для ногтей. Препарат следует применять 2 раза/сут, длительность лечения - до 6 мес.

Для *предупреждения рецидивов инфекции* следует проводить терапию в течение не менее 2 недель после клинического излечения.

Побочное действие:

Экзодерил

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Местные реакции: в отдельных случаях - сухость кожи, гиперемия, жжение.

Побочные эффекты обратимы и не требуют отмены терапии.

Передозировка:

О случаях передозировки не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано применение препарата Экзодерил при беременности и в период лактации (безопасность и эффективность не определена).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не отмечено лекарственного взаимодействия препарата Экзодерил с другими препаратами.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат не предназначен для применения в офтальмологии. Следует избегать попадания препарата в глаза.

Не требуется специальных мер по уничтожению препарата.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не оказывает отрицательного влияния на способность управлять транспортными средствами и выполнять другие виды деятельности, требующие концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Применение в детском возрасте

С осторожностью: детский возраст (опыт клинического применения ограничен).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C. Срок годности - 5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Ekzoderil>