

## Экзоролфинлак



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

#### Форма выпуска, описание и состав

◇ **Лак для ногтей**, прозрачная, бесцветная жидкость.

	<b>1 мл</b>
аморолфина гидрохлорид	55.74 мг,
что эквивалентно аморолфину основанию	50.0 мг

Вспомогательные вещества: сополимер метакриловой кислоты (эудрагит RL PO) - 125.0 мг, триацетин - 10.5 мг, бутилацетат - 50.0 мг, этилацетат - 150.0 мг, этанол - 480.0 мг.

2.5 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с очищающими салфетками (30 шт.), лопаточками (10 шт.) и одноразовыми пилками для ногтей (30 шт.) - пачки картонные.

5 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с очищающими салфетками (30 шт.), лопаточками (10 шт.) и одноразовыми пилками для ногтей (30 шт.) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Противогрибковое средство для наружного применения. Обладает фунгистатическим и фунгицидным действием. Повреждает клеточную мембрану грибов, в основном за счет нарушения синтеза стеролов. Снижает содержание эргостерола, вызывает накопление аномальных неплоскостных стереоизомеров стеролов. Активен в отношении дрожжевых грибов рода *Candida* spp., *Pityrosporum* spp., *Malassezia* spp., *Cryptococcus* spp., дерматофитов (*Trichophyton* spp., *Microsporum* spp., *Epidermophyton* spp.), плесневых грибов (*Alternaria*, *Hendersonula*, *Scopulariopsis*), грибов *Dematiaceae* (*Cladosporium*, *Fonsecaea*, *Wangiella*), диморфных грибов (*Coccidioides*, *Histoplasma* spp., *Sporothrix*) и актиномицетов.

#### Фармакокинетика

При наружном применении в соответствующих лекарственных формах системная абсорбция незначительна.

### Показания к применению:

Онихомикозы, вызванные дерматофитами, дрожжевыми и плесневыми грибами (в том случае если поражено не более 2/3 ногтевой пластинки). Профилактика грибковых поражений ногтей.

## **Относится к болезням:**

- [Дерматит](#)
- [Дерматофития](#)

## **Противопоказания:**

Период новорожденности и ранний детский возраст, беременность, период лактации, повышенная чувствительность к аморолфину.

## **Способ применения и дозы:**

Применяют наружно. Доза и длительность лечения зависят от показаний и используемой лекарственной формы.

## **Побочное действие:**

*Местные реакции:* жжение, гиперемия, зуд.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказано: беременность, период лактации.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Во время лечения не рекомендуется пользоваться косметическим лаком для ногтей или накладными ногтями. При работе с органическими растворителями следует надевать непроницаемые перчатки. Пилки, использованные для обработки пораженных ногтей, не следует использовать для обработки здоровых ногтей.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Ekzorolfinlak>