Экзостат



Код АТХ:

• D01AE22

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

• Нафтифин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр $^{\mathrm{MHH}}$ Википедия $^{\mathrm{MHH}}$ РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com $^{\mathrm{ahr}}$

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

 \Diamond **Крем для наружного применения 1%** белого или почти белого цвета, однородный или слегка зернистый, блестящий, со слабым характерным запахом.

	1 мл
нафтифина гидрохлорид	10 мг

Вспомогательные вещества: изопропилмиристат - 80 мг, полисорбат 60 - 61 мг, цетиловый спирт - 40 мг, стеариловый спирт - 40 мг, цетилпальмитат - 20 мг, сорбитана стеарат - 19 мг, бензиловый спирт - 10 мг, натрия гидроксид - 1.2 мг, вода очищенная - до 1000 мг.

10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

• Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противогрибковое средство, относится к аллиламинам. Механизм действия связан с ингибированием биосинтеза эргостерола, что приводит к нарушению синтеза клеточной стенки возбудителя. Оказывает фунгицидное действие на дерматофиты, плесневые грибы, возбудителей споротрихоза. На дрожжевые грибы действует фунгицидно или фунгистатически в зависимости от конкретного штамма. Обладает противомикробной активностью в отношении различных грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, которые часто сочетаются с грибами. Оказывает противовоспалительное действие, уменьшает зуд. Характеризуется пролонгированным действием (до 24 ч).

Показания к применению:

Онихомикозы, отрубевидный лишай, эпидермофитии крупных кожных складок и стоп, рубромикоз, трихофития, микроспория, кандидозы кожи, микозы со вторичной бактериальной инфекцией.

Относится к болезням:

- Инфекции
- Лишай
- Микоз
- Отрубевидный лишай
- Эпидермофития

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к нафтифину.

Способ применения и дозы:

Диагнозы

- Атопический дерматит
- Бородавки
- Витилиго
- Выпадение волос

Побочное действие:

В отдельных случаях: в месте нанесения сухость и покраснение кожи, чувство жжения.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности в рекомендованных дозах не оказывает неблагоприятного действия на плод.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ekzostat