

## Эладон



### Код АТХ:

- [R03DX03](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Фенспирид](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр<sup>МНН</sup>](#) [Википедия<sup>МНН</sup>](#)  
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

### Форма выпуска:

**Таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой** белого или почти белого цвета, круглые, двояковыпуклые; на поперечном разрезе - ядро белого или почти белого цвета.

|                        |               |
|------------------------|---------------|
|                        | <b>1 таб.</b> |
| фенспирида гидрохлорид | 80 мг         |

**Вспомогательные вещества:** коллидон SR (поливинилацетат 80%, повидон 19%, натрия лаурилсульфат 0.8%, кремния диоксид 0.2%) - 120 мг, кальция гидрофосфата дигидрат - 95.5 мг, кремния диоксид коллоидный - 1.5 мг, магния стеарат - 3 мг.

**Состав пленочной оболочки:** гипромеллоза - 4.5 мг, тальк - 1.764 мг, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) - 1.746 мг, титана диоксид - 0.99 мг или сухая смесь для пленочного покрытия, содержащая гипромеллозу (50%), гипролозу (гидроксипропилцеллюлозу) (19.4%), тальк (19.6%), титана диоксид (11%) - 0.99 мг.

15 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

15 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Интермедианты](#)

## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Противовоспалительная и антибронхоконстрикторная активность фенспирида обусловлена уменьшением продукции ряда биологически активных веществ (цитокинов, особенно фактора некроза опухолей  $\alpha$  (ФНО- $\alpha$ ), производных арахидоновой кислоты, свободных радикалов), играющих важную роль в развитии воспаления и бронхоспазма.

Ингибирование фенспиридом метаболизма арахидоновой кислоты потенцируется его  $H_1$ -антигистаминным действием, т.к. гистамин стимулирует метаболизм арахидоновой кислоты с образованием простагландинов и лейкотриенов. Фенспирид блокирует  $\alpha$ -адренорецепторы, стимуляция которых сопровождается увеличением секреции бронхиальных желез. Таким образом, фенспирид уменьшает действие ряда факторов, которые способствуют гиперсекреции провоспалительных факторов, развитию воспаления и обструкции бронхов. Фенспирид также оказывает спазмолитическое действие.

### Фармакокинетика

После приема внутрь  $C_{max}$  в плазме крови достигается через 6 ч.

$T_{1/2}$  составляет 12 ч. Выводится преимущественно почками.

## Показания к применению:

Заболевания верхних и нижних дыхательных путей:

- ринофарингит и ларингит;
- трахеобронхит;
- бронхит (на фоне хронической дыхательной недостаточности или без нее);
- бронхиальная астма (в составе комплексной терапии);
- респираторные явления (кашель, осиплость голоса, першение в горле) при кори, коклюше и гриппе;
- при инфекционных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем, когда показана стандартная антибиотикотерапия.

Отит и синусит различной этиологии.

## Относится к болезням:

- [Астма](#)
- [Бронхит](#)
- [Грипп](#)
- [Инфекции](#)
- [Кашель](#)
- [Коклюш](#)
- [Ларингит](#)
- [Ринофарингит](#)
- [Синусит](#)
- [Трахеит](#)
- [Трахеобронхит](#)

## Противопоказания:

- возраст до 18 лет;
- повышенная чувствительность к активному веществу и/или какому-либо из компонентов препарата.

## Способ применения и дозы:

Назначают внутрь. **Взрослым** – по 1 таб. 2-3 раза/сут. Максимальная суточная доза составляет 240 мг.

Продолжительность лечения определяется врачом.

## Побочное действие:

Частота развития побочных эффектов, которые могут возникать во время терапии, приведена в следующей градации: очень часто -  $\geq 1/10$  ( $>10\%$ ); часто - от  $\geq 1/100$  до  $<1/10$  ( $>1\%$  и  $<10\%$ ); нечасто - от  $\geq 1/1000$  до  $<1/100$  ( $>0.1\%$  и  $<1\%$ ); редко - от  $\geq 1/10000$  до  $<1/1000$  ( $>0.01\%$  и  $<0.1\%$ ); очень редко -  $<1/10000$  ( $<0.01\%$ ); установленной частоты - частота не может быть подсчитана по доступным данным.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* редко - умеренная тахикардия, выраженность которой уменьшается при снижении дозы препарата.

*Со стороны пищеварительной системы:* часто - желудочно-кишечные расстройства, тошнота, боль в эпигастрии; установленной частоты - диарея, рвота.

*Со стороны ЦНС:* редко - сонливость; установленной частоты - головокружение.

*Со стороны кожных покровов:* редко - эритема, сыпь, крапивница, ангионевротический отек, фиксированная пигментная эритема; установленной частоты - кожный зуд.

*Прочие:* установленной частоты - астения, повышенная усталость.

## Передозировка:

При передозировке препарата (отмечены случаи передозировки при приеме препарата в дозе более 2320 мг) следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

*Симптомы:* сонливость или возбуждение, тошнота, рвота, синусовая тахикардия.

*Лечение:* промывание желудка, мониторинг ЭКГ. Поддержание жизненно важных функций организма.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Прием препарата во время беременности не рекомендуется.

Терапия фенспиридом не является основанием для прерывания наступившей беременности.

Клинические данные о фетотоксическом действии фенспирида или его способности вызывать пороки развития при приеме во время беременности отсутствуют.

Не следует применять Эладон в период грудного вскармливания в связи с отсутствием данных о проникновении фенспирида в грудное молоко.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Специальных исследований по взаимодействию фенспирида с другими лекарственными средствами не проводилось.

Из-за возможного усиления седативного эффекта при приеме блокаторов гистаминовых  $H_1$ -рецепторов не рекомендуется применение препарата Эладон в сочетании с лекарственными средствами, обладающими седативным действием, или совместно с алкоголем.

## Особые указания и меры предосторожности:

*Влияние на способность управления транспортными средствами и механизмами*

Исследований по изучению влияния препарата Эладон на способность управлять транспортными средствами и работу с механизмами не проводилось. Пациенты должны быть осведомлены о возможном развитии сонливости при приеме препарата Эладон, особенно в начале терапии или при сочетании с приемом алкоголя, и должны соблюдать осторожность при управлении автотранспортными средствами и при выполнении работ, требующих высокой скорости психомоторных реакций.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан детям до 18 лет.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

### **Срок годности:**

2 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Eladon>