

Элакосепт



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения, оказывает противомикробное и противовоспалительное действие. Активен в отношении стафилококков, кишечной палочки, синегнойной палочки, протей. Стимулирует репаративные процессы.

Показания к применению:

- в комплексной терапии: заболевания дыхательных путей и ЛОР-органов (хронический тонзиллит, острый ларингофарингит, острый и хронический фарингит, трахеит, бронхит);
- в стоматологии (острый и рецидивирующий афтозный стоматит, красный плоский лишай слизистой оболочки полости рта, пародонтит);
- в гастроэнтерологии (хронический гастродуоденит, энтерит, колит, энтероколит);
- в дерматологии (микробная экзема, нейродермит, розовые угри, вульгарные угри);
- в гинекологии (неспецифические воспалительные заболевания влагалища и шейки матки, в т.ч. кольпит, цервицит, состояния после диатермо- и криодеструкции эрозии шейки матки);
- в урологии (хронический пиелонефрит, хронический цистит, уретрит, хронический простатит).

Относится к болезням:

- [Бронхит](#)
- [Гастрит](#)
- [Гастродуоденит](#)
- [Гастроэнтерит](#)
- [Дерматит](#)
- [Диатез](#)
- [Колит](#)
- [Кольпит](#)
- [Кольпит](#)
- [Ларингит](#)
- [Лишай](#)

- [Нейродермит](#)
- [Пародонтит](#)
- [Пиелит](#)
- [Пиелонефрит](#)
- [Простатит](#)
- [Стоматит](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Трахеит](#)
- [Угри](#)
- [Уретрит](#)
- [Цервицит](#)
- [Цистит](#)
- [Экзема](#)
- [Энтерит](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность.

Способ применения и дозы:

Внутрь, в виде настоя и отвара, по 1/3 стакана 3 раза/сут за 30 мин до еды.

Местно - разбавленными в 2-4 раза, в виде спринцеваний, микроклизм, орошений, примочек и ингаляций. Для приготовления отвара 8-10 г заливают 200 мл кипятка, настаивают 1 ч, кипятят на слабом огне 15 мин и настаивают еще 45 мин. Для приготовления настоя 8-10 г заливают 500 мл кипящей воды, настаивают 2 ч. Для ингаляций применяют отвар или настой в горячем (теплом) неразбавленном виде (в т.ч. при проведении процедур на УЗ-ингаляторе).

Местно, применяют в холодном виде, для примочек используют неразбавленный отвар; для полосканий, орошений и спринцеваний отвар разбавляют в 2-4 раза, настой - в 2 раза; для микроклизм используют по 50 мл неразбавленного теплого отвара или настоя. При острых респираторных заболеваниях применяют в течение 2-3 нед одновременно внутрь и местно, в виде полосканий и ингаляций, 2-5 раз в сутки.

При острых и хронических воспалительных заболеваниях полости рта применяют в течение 5-7 дней одновременно внутрь и местно, в виде полосканий, орошений, примочек и для пропитывания турунд, 2-5 раз/сут.

В гастроэнтерологии и урологии применяют в течение 2-3 нед одновременно внутрь и в микроклизмах.

В дерматологии применяют в течение 2-3 нед одновременно, внутрь и наружно, в виде примочек неразбавленным отваром 1-2 раза/сут.

В гинекологии применяют в течение 2-4 нед, одновременно внутрь и местно, 1-2 раза/сут в виде спринцеваний, орошений и примочек.

Особые указания и меры предосторожности:

Готовые отвар и настой хранят в прохладном месте не более 48 ч.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Elakosept>