Эльбона

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета.

	1 пак.
глюкозамина сульфата натрия хлорид	1.884 г,
в т.ч. глюкозамина сульфат	1.5 г

Вспомогательные вещества: сорбитол, лимонная кислота.

2.2 г - пакеты термосвариваемые (20) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат, стимулирующий процесс репарации хрящевой ткани. Глюкозамина сульфат обладает противовоспалительным и анальгезирующим действием, восполняет эндогенный дефицит глюкозамина, стимулирует синтез протеогликанов и гиалуроновой кислоты синовиальной жидкости; увеличивает проницаемость суставной капсулы, восстанавливает ферментативные процессы в клетках синовиальной мембраны и суставного хряща. Способствует фиксации серы в процессе синтеза хондроитинсерной кислоты, тормозит развитие дегенеративных процессов в суставах, восстанавливает их функцию, уменьшая суставные боли.

Фармакокинетика

Всасывание в ЖКТ - 90%, биодоступность - 26%, $T_{1/2}$ - 70 ч.

Показания к применению:

— остеоартроз периферических суставов;

— остеоартроз суставов позвоночника;

— остеохондроз.

Относится к болезням:

- Остеоартрит
- Остеоартроз
- Остеохондроз

Противопоказания:

— тяжелые нарушения функции почек (хроническая почечная недостаточность);

— беременность;

— период лактации;

— детский возраст до 12 лет (из-за отсутствия клинических данных у этой категории пациентов);

— индивидуальная повышенная чувствительность к глюкозамина сульфату и другим компонентам препарата.

С *осторожностью* следует назначать препарат при непереносимости морепродуктов (креветки, моллюски), т.к. возрастает вероятность развития аллергических реакций, а также пациентам с бронхиальной астмой, сахарным диабетом.

Способ применения и дозы:

Содержимое 1 пакетика растворяют в 200 мл воды, принимают внутрь 1 раз/сут в течение 6 недель.

По назначению врача курс лечения можно повторять с интервалом 2 месяца.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: в отдельных случаях - гастралгия, метеоризм, диарея, запор.

Аллергические реакции: в отдельных случаях - крапивница, зуд.

Передозировка:

Случаи передозировки неизвестны.

Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано применение препарата Эльбона при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Совместим с НПВС, парацетамолом и ГКС.

Увеличивает абсорбцию тетрациклинов, уменьшает - полусинтетических пенициллинов, хлорамфеникола.

Особые указания и меры предосторожности:

При непереносимости морепродуктов (креветки, моллюски) возрастает вероятность развития аллергических реакций на фоне применения Эльбоны.

При нарушениях функции почек

Противопоказание: тяжелые нарушения функции почек.

Применение в детском возрасте

Противопоказано: детский возраст до 12 лет.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Elbona