

## [Эликсин](#)



### **Код АТХ:**

- [D02AF](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru Drugs.com](#)англ

### **Форма выпуска:**

◊ **Раствор для наружного применения (спиртовой)** желтого цвета, прозрачный, со слабым ароматным запахом.

	100 мл
калициловая кислота	2 г
настойка календулы	10 мл
экстракт эхинацеи сухой	0.3 г

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль - 10 мл, вода очищенная - 20 мл, этанол 95% (спирт этиловый) - до 100 мл.

250 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

500 мл - флаконы из полиэтилентерефталата (8) - пачки картонные.

1000 мл - флаконы из полиэтилентерефталата (8) - пачки картонные.

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Органотропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат. Обладает выраженным противовоспалительными свойствами и антимикробной активностью в отношении *Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Candida albicans*. Наличие в составе препарата пропиленгликоля обуславливает защиту кожи от чрезмерного подсушивания этанолом.

### **Показания к применению:**

— профилактика развития пролежней у лежачих больных (в т.ч. после операций, травм, ожогов и обморожений).

## **Относится к болезням:**

- [Обморок](#)
- [Пролежни](#)
- [Травмы](#)

## **Противопоказания:**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого нанесения препарата.

## **Способ применения и дозы:**

Наружно, обрабатывать проблемные места (без нарушения целостности кожного покрова) 2-3 раза в день с помощью ватно-марлевого тампона, пропитанного препаратом. Курс профилактики - 14 дней. При необходимости курсы можно повторять с интервалами 2-4 недели.

## **Побочное действие:**

Аллергические реакции. Лечение симптоматическое.

## **Передозировка:**

При применении препарата в соответствии с рекомендациями случаев передозировки не зарегистрировано.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача!

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Применение препарата Эликсин не исключает терапию другими лекарственными средствами.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Препарат предназначен только для наружного применения!

## **Условия хранения:**

Хранить в сухом, прохладном, защищенном от света месте, недоступном для детей.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

