Элтацин

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Глицин
- Глутаминовая кислота
- Цистин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] [МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки подъязычные*** круглые, двояковыпуклые, белого или белого с желтоватым оттенком цвета с элементами мраморности.

	1 таб.
глицин	70 мг
L-глутаминовая кислота	70 мг
L-цистин	70 мг

Вспомогательные вещества: метилцеллюлоза водорастворимая 7.8 мг, магния стеарат 2.2 мг.

30 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антиоксидантный препарат. Элтацин - комбинированный препарат, который содержит смесь заменимых аминокислот: глицина, глутаминовой кислоты и цистина, являющихся регуляторами обмена веществ: повышающих внутриклеточную концентрацию глутатиона и активность глутатионзависимых ферментов, нормализующих

окислительно-восстановительные процессы и утилизацию кислорода в тканях, за счет чего препарат:

— проявляет антиоксидантное (уменьшая содержание свободных радикалов, перекисных соединений, малонового диальдегида) и антигипоксантное (повышая устойчивость организма к кислородной недостаточности, усиливая процессы синтеза аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ)) действие;

— повышает сократительную способность миокарда;

— увеличивает физическую работоспособность;

— улучшает качество жизни больных с хронической сердечной недостаточностью (повышая социальную адаптацию, улучшая психоэмоциональное состояние);

— ускоряет восстановление работоспособности после интенсивных физических нагрузок у детей.

Показания к применению:

— хроническая сердечная недостаточность I-III функционального класса по классификации NYHA у взрослых (на фоне стандартной терапии);

— хроническая сердечная недостаточность I-II функционального класса по классификации NYHA у детей в возрасте от 12 до 18 лет (на фоне стандартной терапии);

— синдром вегетативной дисфункции у детей в возрасте от 12 до 18 лет;

— профилактика хронического физического перенапряжения и восстановление после интенсивных физических нагрузок при занятии спортом у детей в возрасте от 11 до 15 лет.

Относится к болезням:

- Сердечная недостаточность

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к препарату;

— детский возраст до 11 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Способ применения и дозы:

Подъязычно. Таблетку можно также разжевать и подержать во рту под языком до полного растворения.

Хроническая сердечная недостаточность I-III функционального класса по классификации NYHA у **взрослых**: по 1 таб. 3 раза/сут подъязычно, курс лечения от 1 до 3 месяцев в зависимости от тяжести заболевания, повторные курсы назначаются по рекомендации врача.

Хроническая сердечная недостаточность I-II функционального класса по классификации NYHA у **детей в возрасте от 12 до 18 лет**: по 1 таб. 3 раза/сут подъязычно, курс лечения от 1 до 3 месяцев в зависимости от тяжести заболевания, повторные курсы назначаются по рекомендации врача.

Синдром вегетативной дисфункции у **детей в возрасте от 12 до 18 лет**: по 1 таб. 3 раза/сут подъязычно, курс лечения от 1 до 3 месяцев в зависимости от тяжести заболевания, повторные курсы назначаются по рекомендации врача.

Профилактика хронического физического перенапряжения у **детей в возрасте от 11 до 15 лет**: по 1 таб. 2 раза/сут в течение 2-3 недель.

В *период восстановления после интенсивных физических нагрузок при занятии спортом* у **детей в возрасте от 11 до 15 лет** – по 1 таб. 3 раза/сут в течение 2 недель.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Нет данных.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Клинических исследований применения препарата у беременных и в период лактации не проводилось. Не рекомендуется применять при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Нет сведений.

Особые указания и меры предосторожности:

Можно принимать одновременно с ингибиторами АПФ, бета-адреноблокаторами, диуретическими средствами, антагонистами альдостерона, органическими нитратами и блокаторами "медленных" кальциевых каналов.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 11 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Не использовать позже даты, указанной на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Eltacin