

## Элюфор



### Код АТХ:

- [A07AX03](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Нифуроксазид](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

### Форма выпуска:

#### Форма выпуска, описание и состав

◇ **Суспензия для приема внутрь** желтого цвета, с характерным запахом; допускается появление осадка, после взбалтывания образуется однородная суспензия.

	<b>5 мл</b>
нифуроксазид	200 мг

Вспомогательные вещества: сахароза - 1000 мг, натрия гидроксид - 2 мг, метилпарагидроксибензоат - 5 мг, карбомер - 10.5 мг, симетикон (эмульсия 30%) - 10.5 мг, лимонная кислота моногидрат - 0.7 мг, ароматизатор банановый - 10 мг, вода - до 5 мл.

90 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с мерной ложкой - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Противомикробное средство широкого спектра действия для лечения инфекций ЖКТ (кишечный антисептик), производное нитрофурана. В высоких дозах оказывает бактерицидное действие, в меньших - бактериостатическое.

Активен в отношении грамположительных бактерий: Staphylococcus spp., Streptococcus spp.; грамотрицательных бактерий: Salmonella spp., Shigella spp., Proteus spp.

#### Фармакокинетика

Практически не всасывается из ЖКТ. Действует в просвете кишечника.

## Показания к применению:

Острая диарея бактериального генеза (при отсутствии подозрений на инвазию).

## Относится к болезням:

- [Диарея](#)

## Противопоказания:

Повышенная чувствительность к производным нитрофурана.

Не применять у новорожденных (возраст до 1 месяца) и недоношенных детей.

## Способ применения и дозы:

Взрослым - по 200 мг 4 раза/сут. Детям в возрасте от 1 месяца до 2.5 лет - по 100 мг 2-3 раза/сут; старше 2.5 лет - по 200 мг 3 раза/сут. Продолжительность курса лечения - не более 7 дней.

## Побочное действие:

*Возможно:* аллергические реакции.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение нифуроксазида при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) по показаниям.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Одновременный прием этанола может вызывать симптомы гиперчувствительности.

## Особые указания и меры предосторожности:

Диагнозы

- Боли в мышцах
- Гематомы подкожные
- Инородные тела
- Кровотечения

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Elyufor>