Эльжина



Код АТХ:

- G01BA

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Неомицин
- Орнидазол
- Преднизолон
- Эконазол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Таблетки вагинальные	**1 таб.**
орнидазол	500 мг
неомицин (в форме сульфата)	65000 ЕД
преднизолон (в форме натрия фосфата)	3 мг
эконазол (в форме нитрата)	100 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат 297 мг, крахмал картофельный 90 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил) 12 мг, повидон низкомолекулярный 19 мг, кросповидон 24 мг, полисорбат 20 3 мг, кальция стеарат 12 мг, тальк 18 мг.

3 шт. - упаковки ячейковые контурные (алюминий/ПВХ) (2) - пачки картонные.
3 шт. - упаковки ячейковые контурные (алюминий/ПВХ) (3) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат с антибактериальным, противопротозойным, противогрибковым и противовоспалительным действием для местного применения в гинекологии.

Эффективен в отношении Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Streptococcus группы B3, Candida albicans. Оказывает противовоспалительное, противозудное и антиэкссудативное действие. Уменьшает образование, высвобождение и активность медиаторов воспаления (гистамина, кинина, простагландинов, лизосомальных ферментов). Подавляет миграцию клеток к месту воспаления; уменьшает вазодилатацию и повышенную проницаемость сосудов в очаге воспаления. Уменьшает экссудацию благодаря вазоконстрикторному действию. Способствует быстрому уменьшению жжения и зуда.

Фармакокинетика

Исследования фармакокинетики препарата Эльжина не проводились в связи с низкой системной абсорбцией.

Показания к применению:

— бактериальный вагинит, вызванный банальной пиогенной флорой;

— вульвовагинальные микозы, вызванные грибами рода Candida;

— вагиниты, вызванные смешанной инфекцией.

Относится к болезням:

- Вагинит
- Вульвит
- Инфекции
- Микоз

Противопоказания:

— гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата;

— детский и подростковый возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы:

Одну таблетку вводят ежедневно глубоко во влагалище в положении лежа перед сном. Перед введением во влагалище таблетку необходимо подержать в холодной кипяченой воде в течение 20-30 с. После введения таблетки следует лежать в течение 10-15 мин. Средняя продолжительность курса лечения - 6-9 дней.

Во время менструальных кровотечений вводят интравагинально по обычной схеме.

Побочное действие:

Местные реакции: редко - чувство жжения, местное раздражение, сухость влагалища (особенно в начале лечения). В отдельных случаях возможны аллергические реакции.

Передозировка:

В связи с низкой степенью абсорбции компонентов в системный кровоток передозировка маловероятна.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Несовместимости или взаимодействия действующих компонентов Эльжины с другими лекарственными средствами не описаны. Рекомендуется информировать врача об одновременном лечении другими лекарственными препаратами.

Особые указания и меры предосторожности:

В случае лечения вагинитов рекомендуется одновременное лечение половых партнеров. Может развиться перекрестная аллергизация и перекрестная устойчивость к аминогликозидам.

Применение препарата более 9 дней не рекомендуется.

Не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском и подростковом возрасте до 18 лет.

Условия хранения:

Препарат хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.

Не использовать по истечении срока годности.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Elzhina