

Эльжина



Код АТХ:

- [G01BA](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Неомицин](#)
- [Орнидазол](#)
- [Преднизолон](#)
- [Эконазол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{мнн} [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#) [Википедия](#)^{мнн} [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

| Таблетки вагинальные | 1 таб. |
|--------------------------------------|----------|
| орнидазол | 500 мг |
| неомицин (в форме сульфата) | 65000 ЕД |
| преднизолон (в форме натрия фосфата) | 3 мг |
| эконазол (в форме нитрата) | 100 мг |

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат 297 мг, крахмал картофельный 90 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил) 12 мг, повидон низкомолекулярный 19 мг, кросповидон 24 мг, полисорбат 20 3 мг, кальция стеарат 12 мг, тальк 18 мг.

3 шт. - упаковки ячейковые контурные (алюминий/ПВХ) (2) - пачки картонные.

3 шт. - упаковки ячейковые контурные (алюминий/ПВХ) (3) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат с антибактериальным, противопротозойным, противогрибковым и противовоспалительным действием для местного применения в гинекологии.

Эффективен в отношении *Escherichia coli*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus* группы ВЗ, *Candida albicans*. Оказывает противовоспалительное, противозудное и антиэкссудативное действие. Уменьшает образование, высвобождение и активность медиаторов воспаления (гистамина, кинина, простагландинов, лизосомальных ферментов). Подавляет миграцию клеток к месту воспаления; уменьшает вазодилатацию и повышенную проницаемость сосудов в очаге воспаления. Уменьшает экссудацию благодаря вазоконстрикторному действию. Способствует быстрому уменьшению жжения и зуда.

Фармакокинетика

Исследования фармакокинетики препарата Эльжина не проводились в связи с низкой системной абсорбцией.

Показания к применению:

- бактериальный вагинит, вызванный банальной пиогенной флорой;
- вульвовагинальные микозы, вызванные грибами рода *Candida*;
- вагиниты, вызванные смешанной инфекцией.

Относится к болезням:

- [Вагинит](#)
- [Вульвит](#)
- [Инфекции](#)
- [Микоз](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата;
- детский и подростковый возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы:

Одну таблетку вводят ежедневно глубоко во влагалище в положении лежа перед сном. Перед введением во влагалище таблетку необходимо подержать в холодной кипяченой воде в течение 20-30 с. После введения таблетки следует лежать в течение 10-15 мин. Средняя продолжительность курса лечения - 6-9 дней.

Во время менструальных кровотечений вводят интравагинально по обычной схеме.

Побочное действие:

Местные реакции: редко - чувство жжения, местное раздражение, сухость влагалища (особенно в начале лечения). В отдельных случаях возможны аллергические реакции.

Передозировка:

В связи с низкой степенью абсорбции компонентов в системный кровоток передозировка маловероятна.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Несовместимости или взаимодействия действующих компонентов Эльжины с другими лекарственными средствами не описаны. Рекомендуется информировать врача об одновременном лечении другими лекарственными препаратами.

Особые указания и меры предосторожности:

В случае лечения вагинитов рекомендуется одновременное лечение половых партнеров. Может развиваться перекрестная аллергизация и перекрестная устойчивость к аминогликозидам.

Применение препарата более 9 дней не рекомендуется.

Не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском и подростковом возрасте до 18 лет.

Условия хранения:

Препарат хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Не использовать по истечении срока годности.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Elzhina>