Эмокси-оптик



Код АТХ:

- S01XA

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Метилэтилпиридинол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капли глазные 1% бесцветные или слабоокрашенные, слегка опалесцирующие.

	1 мл
метилэтилпиридинола гидрохлорид (эмоксипин)	10 мг

Вспомогательные вещества: натрия сульфит безводный, натрия бензоат, калия дигидрофосфат (калия фосфат однозамещенный), натрия гидрофосфата додекагидрат (натрия фосфат двузамещенный 12-водный), метилцеллюлоза, вода д/и.

5 мл - флаконы пластиковые (1) с насадкой-дозатором - пачки картонные.
10 мл - флаконы пластиковые (1) с насадкой-дозатором - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Гематотропные средства
- Метаболики
- Органотропные средства
- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антиоксидантный препарат, препятствующий перекисному окислению липидов клеточных мембран. Обладает ангиопротекторной, антиагрегантной и антигипоксической активностью.

Уменьшает проницаемость капилляров и укрепляет сосудистую стенку (ангиопротекторное действие). Уменьшает вязкость крови и агрегацию тромбоцитов (антиагрегантное действие). Ингибирует образование свободных радикалов (антиоксидантное действие). Обладает мембраностабилизирующим действием. Повышает устойчивость тканей к нехватке кислорода (антигипоксическое действие).

Обладает ретинопротекторными свойствами, защищает сетчатку и другие ткани глаза от повреждающего действия света высокой интенсивности. Способствует рассасыванию внутриглазных кровоизлияний, снижает свертываемость крови, улучшает микроциркуляцию глаза. Стимулирует репаративные процессы в роговице (в т.ч. в раннем послеоперационном и послераневом периоде).

Фармакокинетика

Распределение

Быстро проникает в органы и ткани, где происходит его депонирование и метаболизм. В тканях глаза концентрация выше, чем в крови.

Метаболизм

Обнаружено 5 метаболитов, представленных деалкилированными и конъюгированными продуктами превращения. Метаболиты экскретируются почками. В значительных количествах в печеночной ткани обнаруживается 2-этил-6-метил-3-оксипиридин-фосфат.

Показания к применению:

— кровоизлияния в переднюю камеру глаза (лечение);

— кровоизлияния в склеру у лиц пожилого возраста (лечение и профилактика);

— воспаления и ожоги роговицы (лечение и профилактика);

— осложнения при близорукости (лечение);

— защита роговицы (при ношении контактных линз)

Относится к болезням:

- Воспаление
- Кровоизлияния в переднюю камеру глаза
- Склерит

Противопоказания:

— беременность;

— период лактации (грудного вскармливания);

— детский и подростковый возраст до 18 лет;

— гиперчувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат Эмокси-оптик назначают взрослым. Закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 2-3 раза/сут.

Курс лечения 3-30 дней. При необходимости и хорошей переносимости курс лечения может быть продолжен до 6 месяцев и может повторяться 2-3 раза в год.

Побочное действие:

Местные реакции: ощущение жжения, зуд, кратковременная гиперемия конъюнктивы; редко - местные аллергические реакции.

Передозировка:

Передозировка препарата Эмокси-оптик не установлена.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат Эмокси-оптик не следует смешивать с другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

При необходимости одновременного применения других глазных капель препарат закапывают последним, после полного всасывания предшествующих капель (не менее, чем через 10-15 мин).

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский и подростковый возраст до 18 лет.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.

После вскрытия флакона препарат следует использовать в течение 1 месяца.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Emoksi-optik