Эмосинт



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Десмопрессин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Раствор для инъекций прозрачный, бесцветный, без видимых механических включений.

	1 амп. (0.5 мл)
десмопрессина* ацетата тригидрат	4 мкг,
в т.ч. десмопрессин*	3.614 мкг

Вспомогательные вещества: натрия хлорид, хлорбутанол, хлористоводородная кислота 0.1М, вода д/и.

0.5 мл - ампулы бесцветного стекла (5) - поддоны (2) - пачки картонные.

Раствор для инъекций прозрачный, бесцветный, без видимых механических включений.

	1 амп. (1 мл)
десмопрессина* ацетата тригидрат	20 мкг,
в т.ч. десмопрессин*	18.070 мкг

Вспомогательные вещества: натрия хлорид, хлорбутанол, хлористоводородная кислота 0.1М, вода д/и.

1 мл - ампулы бесцветного стекла (5) - поддоны (2) - пачки картонные.

* *непатентованное международное наименование, рекомендованное ВОЗ - дезмопрессин.*

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гемостатический препарат. Синтетический аналог 8-аргинин вазопрессина, обладает свойствами естественного антидиуретического гормона.

Гемостатическое действие обусловлено способностью десмопрессина повышать концентрацию в плазме крови фактора свертывания VIII, способствовать освобождению активатора плазминогена в крови.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Эмосинт не предоставлены.

Показания к применению:

— гемофилия А (легкая и среднетяжелые формы);

— болезнь Виллебранда тип I;

— предоперационная подготовка больных с болезнью Виллебранда;

— подготовка больных уремией, имеющих удлиненное время кровотечения, к инвазивным манипуляциям.

Относится к болезням:

- Гемофилия
- Уремия

Противопоказания:

— болезнь Виллебранда тип II;

— ингибиторная форма гемофилии А;

— гемофилия В;

— артериальная гипертензия;

— хронический нефрит;

— анурия;

— отечный синдром различного генеза;

— хроническая сердечная недостаточность;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Эмосинт назначают в дозе 0.3 мкг/кг массы тела/сут.

Эмосинт можно вводить п/к или в/в капельно, предварительно растворив в физиологическом растворе (при массе тела менее 10 кг рекомендуется использовать 10 мл физиологического раствора, при массе тела более 10 кг - 50 мл физиологического раствора). В/в препарат вводят медленно, в течение 15-30 мин. Повторное введение препарата возможно не ранее чем через 48 ч.

Побочное действие:

Со стороны сердечно-сосудистой системы: преходящая головная боль; редко – гиперемия лица, отечность, повышение АД, незначительное снижение АД с соответствующим увеличением ЧСС, тромбозы.

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, умеренно выраженная боль в животе.

Со стороны водно-электролитного обмена: редко - гипергидратация, гипонатриемия.

Аллергические реакции: в единичных случаях - анафилактические реакции.

Прочие: умеренно выраженная боль во влагалище; редко - жжение в месте инъекции.

Передозировка:

Симптомы: усиление проявлений побочных эффектов.

Лечение: специфического антидота нет. В случае передозировки необходимо провести коррекцию дозы препарата или временно прекратить его применение.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Безопасность применения препарата Эмосинт при беременности и в период лактации не установлена, поэтому применение его возможно только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода и грудного ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении Эмосинта с хлорпропамидом, клофибратом, индометацином наблюдается усиление антидиуретического действия; при одновременном применении с глибутидом, карбамазепином – ослабление.

Эмосинт потенцирует действие гипертензивных препаратов.

Особые указания и меры предосторожности:

Эмосинт следует назначать с осторожностью при бронхиальной астме, при наличии в анамнезе эпилепсии, мигрени, склонности к тромбозам.

При применении Эмосинта необходимо контролировать объем употребляемой жидкости, особенно у молодых и пожилых пациентов, для предотвращения гипергидратации и гипонатриемии.

При применении Эмосинта необходимо контролировать также диурез, т.к. благодаря антидиуретическому эффекту препарат может задерживать жидкость в организме.

Повторное введение препарата менее чем через 48 ч может снизить его эффективность.

Препарат эффективен при активности фактора свертывания крови VIII более 5%, поэтому необходимо контролировать уровень фактора свертывания VIII в крови.

При в/в введении следует контролировать ЧСС.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Эмосинт не оказывает действия на возможность управления автомобильным транспортом и механизмами.

При нарушениях функции почек

Препарат противопоказан при хроническом нефрите, анурии, отечном синдроме различного генеза.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света месте при температуре от 2° до 8°С. Срок годности – 2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Emosint