

Эндосорб



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◇ **Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь** от почти белого или бело-серого или бело-желтого цвета, до желто-серого или желто-коричневого цвета с запахом от слабого неспецифического до слабого ванильного; (апельсиновый).

	1 пак.
диосмектит (смектит диоктаэдрический)	3 г

Вспомогательные вещества: декстрозы моногидрат - 0.679 г, натрия сахарината дигидрат - 0.021 г, ароматизатор апельсиновый - 0.01 г, ароматизатор ванильный - 0.05 г.

◇ **Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь** от почти белого или бело-серого или бело-желтого цвета, до желто-серого или желто-коричневого цвета с запахом от слабого неспецифического до слабого ванильного; (ванильный).

	1 пак.
диосмектит (смектит диоктаэдрический)	3 г

Вспомогательные вещества: декстрозы моногидрат - 0.749 г, натрия сахарината дигидрат - 0.007 г, ванилин - 0.004 г.

3.76 г - пакетики термосвариваемые из комбинированного материала (10) - пачки картонные.

3.76 г - пакетики термосвариваемые из комбинированного материала (30) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Адсорбирующее и противодиарейное средство природного происхождения. Оказывает защитное действие на слизистую оболочку кишечника, обладает выраженным адсорбирующим и слабовыраженным обволакивающим действием. Является стабилизатором слизистого барьера, проникает в слизь и увеличивает продолжительность ее жизни, образуя физический барьер, который защищает слизистую оболочку пищеварительного тракта от отрицательного действия H^+ ионов, кишечных микроорганизмов и их токсинов.

Фармакокинетика

Не абсорбируется, выводится в неизменном виде.

Показания к применению:

Симптоматическое лечение болей, связанных с заболеваниями пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки; кишечная колика; острая и хроническая диарея (особенно у детей).

Относится к болезням:

- [Диарея](#)
- [Кишечная колика](#)
- [Кишечные колики](#)

Противопоказания:

Кишечная непроходимость, повышенная чувствительность к диосмектиту.

Способ применения и дозы:

При приеме внутрь для взрослых суточная доза составляет 9 г. Для детей в возрасте старше 2 лет - 6-9 г/сут, в возрасте 1-2 лет - 6 г/сут, в возрасте до 1 года - 3 г/сут.

Побочное действие:

Диагнозы

- Болезнь Крона
- Боли в животе
- Гастрит
- Дисбактериоз кишечника

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном приеме внутрь диосмектит уменьшает скорость и/или степень абсорбции других лекарственных препаратов.

Особые указания и меры предосторожности:

Интервал между приемом диосмектита и других лекарственных средств должен составлять 1-2 ч.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Endosorb>