

## [Энелбин 100 Ретард](#)



### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакологические свойства:**

#### ***Фармакодинамика***

Периферический вазодилататор. Улучшает внутриклеточный метаболизм (в т.ч. в областях с нарушенным кровообращением), оказывает антиагрегантное действие. Расширяет периферические артерии, улучшает кровоснабжение и кислородное обеспечение тканей, а также кровообращение в головном мозге и в сетчатке глаза. Способствует повышению уровня АТФ, улучшает утилизацию глюкозы и кислорода, уменьшает уровень молочной кислоты в клетках в условиях гипоксии тканей.

### **Показания к применению:**

Нарушение периферического кровообращения (симптом перемежающейся хромоты), синдром Рейно, судороги в икроножных мышцах, боли в конечностях в покое, начальная стадия гангрены, трофические язвы, диабетическая ангиопатия, акроцианоз, пролежни. Нарушение мозгового кровообращения, нарушения кровоснабжения сетчатки.

### **Относится к болезням:**

- [Ангина](#)
- [Ангиопатия](#)
- [Диабетическая ангиопатия](#)
- [Пролежни](#)
- [Судороги](#)

### **Противопоказания:**

Острый инфаркт миокарда, острый геморрагический инсульт, склонность к сосудистым коллапсам, артериальная гипотензия, повышенная судорожная активность, эпилепсия, тяжелая сердечная недостаточность (III и IV функциональный класс по классификации NYHA), аритмии, повышенная чувствительность к нафтидрофурилу.

### **Способ применения и дозы:**

Для приема внутрь разовая доза - 200 мг, частота приема - 2-3 раза/сут во время еды.

В/м, в/в (крупные вены) или в/а - по 100 мг 2-3 раза/сут (при острых сосудистых нарушениях), с последующим

переходом на длительную пероральную терапию.

### **Побочное действие:**

*Со стороны пищеварительной системы:* тошнота, рвота, диарея, снижение аппетита.

*Прочие:* при быстром в/в или в/а введении - возбуждение ЦНС, депрессия.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Данные об эффективности и безопасности применения нафтидрофурила при беременности и в период лактации отсутствуют.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Фармацевтически несовместим с растворами, содержащими ионы кальция.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Enelbin\\_100\\_Retard](http://drugs.thead.ru/Enelbin_100_Retard)