Энелбин 100 Ретард



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Периферический вазодилататор. Улучшает внутриклеточный метаболизм (в т.ч. в областях с нарушенным кровообращением), оказывает антиагрегантное действие. Расширяет периферические артерии, улучшает кровоснабжение и кислородное обеспечение тканей, а также кровообращение в головном мозге и в сетчатке глаза. Способствует повышению уровня АТФ, улучшает утилизацию глюкозы и кислорода, уменьшает уровень молочной кислоты в клетках в условиях гипоксии тканей.

Показания к применению:

Нарушение периферического кровообращения (симптом перемежающейся хромоты), синдром Рейно, судороги в икроножных мышцах, боли в конечностях в покое, начальная стадия гангрены, трофические язвы, диабетическая ангиопатия, акроцианоз, пролежни. Нарушение мозгового кровообращения, нарушения кровоснабжения сетчатки.

Относится к болезням:

- Ангина
- Ангиопатия
- Диабетическая ангиопатия
- Пролежни
- Судороги

Противопоказания:

Острый инфаркт миокарда, острый геморрагический инсульт, склонность к сосудистым коллапсам, артериальная гипотензия, повышенная судорожная активность, эпилепсия, тяжелая сердечная недостаточность (III и IV функциональный класс по классификации NYHA), аритмии, повышенная чувствительность к нафтидрофурилу.

Способ применения и дозы:

Для приема внутрь разовая доза - 200 мг, частота приема - 2-3 раза/сут во время еды.

В/м, в/в (крупные вены) или в/а - по 100 мг 2-3 раза/сут (при острых сосудистых нарушениях), с последующим

переходом на длительную пероральную терапию.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диарея, снижение аппетита.

Прочие: при быстром в/в или в/а введении - возбуждение ЦНС, депрессия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные об эффективности и безопасности применения нафтидрофурила при беременности и в период лактации отсутствуют.

Особые указания и меры предосторожности:

Фармацевтически несовместим с растворами, содержащими ионы кальция.

Источник: http://drugs.thead.ru/Enelbin_100_Retard