Энема Клин



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Раствор для ректального введения***	**1 шт.**
натрия дигидрофосфат моногидрат	19.2 г
натрия гидрофосфат гептагидрат	7.2 мг

120 мл - флаконы пластиковые (1) с пластиковым наконечником (клизма) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Энема Клин - солевое слабительное, действие которого основано на увеличении с помощью осмотических процессов задержки воды в просвете кишечника. Накопление жидкости в кишке приводит к усилению перистальтики и последующему очищению кишечника. Время наступления эффекта - 5-7 минут после введения.

Показания к применению:

— запор;

— подготовка к эндоскопическому исследованию прямой кишки;

— подготовка к рентгенологическому исследованию органов брюшной полости;

— подготовка к хирургическим операциям на органах брюшной полости, родам.

Относится к болезням:

- Запор

Противопоказания:

Индивидуальная гиперчувствительность, непроходимость кишечника, перфорация кишечника, детский возраст.

Способ применения и дозы:

Ректально по 120 мл (один флакон).

Перед применением лечь на левый бок, согнув правую ногу в колене, снять защитный колпачок со смазанного наконечника флакона и аккуратно ввести наконечник в анальное отверстие, надавив с небольшим усилием в направлении пупка. Выдавить содержимое флакона и вынуть наконечник из анального отверстия. Необязательно выдавливать содержимое до конца, поскольку флакон содержит 15 мл избытка препарата. Рекомендуемое положение тела следует сохранить до наступления позывов к опорожнению.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, тошнота, рвота, боли в животе, местнораздражающее действие.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат может применяться при беременности и в период грудного вскармливания.

Особые указания и меры предосторожности:

В случае появления тошноты, рвоты, болей в брюшной полости проконсультируйтесь с врачом.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте.

Условия хранения:

В сухом месте, при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности. 3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Enema_Klin