# Энерион




## Код АТХ:

- A11DA02

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Сульбутиамин

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

***Таблетки, покрытые оболочкой*** оранжевого цвета, круглые, двояковыпуклые, допускается незначительная неоднородность поверхности (по степени глянцевости), окрашивания и наличие незначительных вкраплений.

| | **1 таб.** |
|---|---|
| сульбутиамин | 200 мг |

*Вспомогательные вещества:* крахмал кукурузный - 12 мг, крахмальная паста высушенная - 40 мг, глюкоза (декстроза) безводная - 20 мг, лактозы моногидрат - 65.5 мг, магния стеарат - 3.5 мг, тальк - 9 мг.

*Состав оболочки:* натрия гидрокарбонат - 0.603 мг, натрия карбоксиметилцеллюлоза- 0.556 мг, белый пчелиный воск - 0.201 мг, титана диоксид (E171) - 8.43 мг, этилцеллюлоза - 0.485 мг, сансет желтый FCF (E110) - 3 мг, глицерола моноолеат - 0.242 мг, полисорбат 80 - 0.302 мг, повидон - 0.692 мг, сахароза - 106.956 мг, кремния диоксид коллоидный безводный (Aerosil 130), тальк 28.21 мг.

10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
15 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
15 шт. - блистеры (4) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Синтетическое соединение, близкое по строению к тиамину. Молекула сульбутиамина имеет открытый тиазольный цикл, дополнительную дисульфидную связь и липофильный эфир. Благодаря такой модификации быстро всасывается из ЖКТ и легко проникает через ГЭБ.

В отличие от тиамина, способен накапливаться в клетках ретикулярной формации, гиппокампе и зубчатой извилине, а также в клетках волокон Пуркинье и клубочках зернистого слоя коры мозжечка.

На фоне приема Энериона улучшается координация движений и увеличивается устойчивость к физическим нагрузкам, повышается устойчивость структур коры головного мозга к повторяющейся гипоксии.

***Фармакокинетика***

*Всасывание*

После приема внутрь сульбутиамин быстро всасывается из ЖКТ, $C_{max}$ в плазме крови достигается через 1-2 ч.

*Выведение*

$T_{1/2}$ составляет около 5 ч. Выводится с мочой.

## Показания к применению:

— симптоматическое лечение функциональной астении.

## Относится к болезням:

- Астения

## Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

**Взрослым** препарат назначают в суточной дозе 400-600 мг (2-3 таб.) в 2 приема.

Таблетки следует принимать внутрь во время завтрака и во время обеда.

Продолжительность курса лечения не должна превышать 4 недель.

## Побочное действие:

*Со стороны ЦНС:* тремор, головная боль, возбуждение, общее недомогание.

*Со стороны пищеварительной системы:* диспепсия.

*Аллергические реакции:* возможны кожные проявления.

## Передозировка:

*Симптомы:* возможно возбужденное состояние с явлениями эйфории и тремора конечностей.

*Лечение:* симптомы быстро исчезают самостоятельно и не требуют специального лечения.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Согласно результатам клинических исследований препарат не влияет на развитие плода. Тем не менее, в связи с отсутствием достаточных клинических данных Энерион не рекомендуется назначать при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие отсутствует.

## Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется назначать Энерион пациентам с лактазной недостаточностью, галактоземией или синдромом глюкозной/галактозной мальабсорбции в связи с тем, что в состав препарата входит лактозы моногидрат.

*Использование в педиатрии*

Препарат не рекомендуется назначать **детям и подросткам в возрасте до 18 лет** из-за отсутствия клинических данных.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Препарат не влияет на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.

***Применение в детском возрасте***

Препарат не рекомендуется назначать **детям и подросткам в возрасте до 18 лет** из-за отсутствия клинических данных.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

## Срок годности:

3 года.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Enerion