

Энгистол



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки подъязычные гомеопатические** круглые, плоскоцилиндрические, с фаской, от белого до желтовато-белого цвета, иногда с желтоватыми или сероватыми вкраплениями; без запаха.

	1 таб.
Vincetoxicum hirundinaria (винцетоксикум гирундиная) D6	75 мг
Vincetoxicum hirundinaria (винцетоксикум гирундиная) D10	75 мг
Vincetoxicum hirundinaria (винцетоксикум гирундиная) D30	75 мг
Sulfur (сульфур) D4	37.5 мг
Sulfur (сульфур) D10	37.5 мг

Вспомогательные вещества: магния стеарат, лактоза.

50 шт. - пеналы полипропиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гомеопатическое средство.

Показания к применению:

— в комплексной терапии простудных заболеваний и гриппозных состояний (лихорадка, общая слабость, головная боль, насморк) в качестве средства, активирующего неспецифические защитные механизмы организма.

Относится к болезням:

- [Головная боль](#)
- [Грипп](#)
- [Насморк](#)

Противопоказания:

- детский возраст (до 3-х лет);
- врожденной галактоземия, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденная лактозная недостаточность;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

По 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком за полчаса до еды или спустя 1 час после приема пищи. Курс лечения - 2-3 недели. При необходимости курс лечения можно повторить после консультации с врачом. При обострениях принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более двух часов.

Применение препарата у детей от 3 лет возможно по назначению и под контролем врача..

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.

При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,025 ХЕ.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 3 лет.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте при температуре от 15°C до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

ЭНГИСТОЛ

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Источник: <http://drugs.thead.ru/Engistol>