

Энтеродез



Код АТХ:

- [A07BC](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Повидон](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Порошок для приготовления раствора для приема внутрь** белого или слегка желтоватого цвета, со слабым специфическим запахом, гигроскопичен; приготовленный раствор - прозрачная или слабо опалесцирующая, бесцветная или слегка желтоватая жидкость.

	1 пак.
повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский с молекулярной массой 12600±2700)	5 г

Пакеты из комбинированного материала.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Энтеросорбент. Энтеродез связывает токсины, поступающие в ЖКТ и образующиеся в организме, и выводит их через кишечник.

Фармакокинетика

Не всасывается, не метаболизируется, выводится через ЖКТ.

Показания к применению:

В качестве средства дезинтоксикации при:

— токсических формах острых инфекционных желудочно-кишечных заболеваний (дизентерия, сальмонеллезы, пищевые токсикоинфекции);

— печеночной недостаточности;

— почечной недостаточности.

Относится к болезням:

- [Дизентерия](#)
- [Инфекции](#)
- [Сальмонеллез](#)
- [Токсикоз](#)

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь, спустя 1-2 ч после приема пищи или лекарственных препаратов.

Препарат разводят из расчета 2.5 г порошка на 50 мл холодной кипяченой воды. Для улучшения вкусовых качеств в раствор может быть добавлен сахар или фруктовые соки.

Взрослым назначают по 100 мл приготовленного раствора 1-3 раза/сут в течение 2-7 дней (до исчезновения симптомов интоксикации).

Детям старше 1 года препарат назначают из расчета 0.3 г/кг массы тела/сут.

Возраст	Режим дозирования
от 1 до 3 лет	50 мл 2 раза/сут
от 4 до 6 лет	50 мл 3 раза/сут
от 7 до 10 лет	100 мл 2 раза/сут
от 11 до 14 лет	100 мл 3 раза/сут

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: быстро проходящие тошнота и рвота (не являются основанием для отмены препарата).

Возможно развитие аллергических реакций.

Передозировка:

В случаях передозировки усиливаются побочные эффекты препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Достаточного опыта по применению препарата при беременности и в период лактации нет. Возможно применение Энтеродеза у беременных и кормящих матерей по назначению лечащего врача, если ожидаемый лечебный эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение Энтеродеза совместно с другими лекарственными препаратами для приема внутрь может резко замедлять скорость и/или уменьшать степень их всасывания из ЖКТ.

Особые указания и меры предосторожности:

Приготовленный раствор должен храниться в холодильнике при температуре 4°C не более 3-х дней.

Применение в детском возрасте

Детям старше 1 года препарат назначают из расчета 0.3 г/кг массы тела/сут.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от -10° до +30°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Enterodez>