

## Энтеродез



### Код АТХ:

- [A07BC](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Повидон](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Порошок для приготовления раствора для приема внутрь** белого или слегка желтоватого цвета, со слабым специфическим запахом, гигроскопичен; приготовленный раствор - прозрачная или слабо опалесцирующая, бесцветная или слегка желтоватая жидкость.

	<b>1 пак.</b>
повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский с молекулярной массой 12600±2700)	5 г

Пакеты из комбинированного материала.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)
- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Энтеросорбент. Энтеродез связывает токсины, поступающие в ЖКТ и образующиеся в организме, и выводит их через кишечник.

#### Фармакокинетика

Не всасывается, не метаболизируется, выводится через ЖКТ.

### Показания к применению:

В качестве средства дезинтоксикации при:

— токсических формах острых инфекционных желудочно-кишечных заболеваний (дизентерия, сальмонеллезы, пищевые токсикоинфекции);

— печеночной недостаточности;

— почечной недостаточности.

## Относится к болезням:

- [Дизентерия](#)
- [Инфекции](#)
- [Сальмонеллез](#)
- [Токсикоз](#)

## Противопоказания:

— повышенная чувствительность к препарату.

## Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь, спустя 1-2 ч после приема пищи или лекарственных препаратов.

Препарат разводят из расчета 2.5 г порошка на 50 мл холодной кипяченой воды. Для улучшения вкусовых качеств в раствор может быть добавлен сахар или фруктовые соки.

**Взрослым** назначают по 100 мл приготовленного раствора 1-3 раза/сут в течение 2-7 дней (до исчезновения симптомов интоксикации).

**Детям старше 1 года** препарат назначают из расчета 0.3 г/кг массы тела/сут.

Возраст	Режим дозирования
от 1 до 3 лет	50 мл 2 раза/сут
от 4 до 6 лет	50 мл 3 раза/сут
от 7 до 10 лет	100 мл 2 раза/сут
от 11 до 14 лет	100 мл 3 раза/сут

## Побочное действие:

*Со стороны пищеварительной системы:* быстро проходящие тошнота и рвота (не являются основанием для отмены препарата).

Возможно развитие аллергических реакций.

## Передозировка:

В случаях передозировки усиливаются побочные эффекты препарата.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Достаточного опыта по применению препарата при беременности и в период лактации нет. Возможно применение Энтеродеза у беременных и кормящих матерей по назначению лечащего врача, если ожидаемый лечебный эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Применение Энтеродеза совместно с другими лекарственными препаратами для приема внутрь может резко замедлять скорость и/или уменьшать степень их всасывания из ЖКТ.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Приготовленный раствор должен храниться в холодильнике при температуре 4°C не более 3-х дней.

### ***Применение в детском возрасте***

**Детям старше 1 года** препарат назначают из расчета 0.3 г/кг массы тела/сут.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от -10° до +30°C.

## **Срок годности:**

2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Enterodez>