Энтерофурил



Код АТХ:

- A07AX03

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Нифуроксазид

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капсулы твердые желатиновые, размер №2, желтого цвета, непрозрачные; содержимое капсул - желтый порошок.

	1 капс.
нифуроксазид	100 мг

Вспомогательные вещества: сахароза, крахмал кукурузный, целлюлоза порошкообразная, магния стеарат.

Состав оболочки капсулы: титана диоксид C.I. 77891 (E171), хинолин желтый C.I. 47005 (E104), оранжевый желтый C.I. 15987 (E110), азорубин C.I. 14720 (E122), косинил красный C.I. 16255 (E124), желатин.

10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

Капсулы твердые желатиновые, размер №0, желтого цвета, непрозрачные; содержимое капсул - желтый порошок или порошок с включениями в виде небольших кусочков спрессованной массы или спрессованный порошок, который при легком нажатии рассыпается.

	1 капс.
нифуроксазид	200 мг

Вспомогательные вещества: сахароза, крахмал кукурузный, целлюлоза порошкообразная, магния стеарат.

Состав оболочки капсулы: титана диоксид C.I. 77891 (E171), хинолин желтый C.I. 47005 (E104), азорубин C.I. 14720 (E122), косинил красный C.I. 16255 (E124), желатин.

8 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

8 шт. - блистеры (4) - пачки картонные.

◊ ***Суспензия для приема внутрь*** густая, желтого цвета, с запахом банана.

	5 мл
нифуроксазид	200 мг

Вспомогательные вещества: сахароза, натрия гидроксид, метилпарагидроксибензоат, этанол 96%, карбомер, лимонная кислота, аромат банана, вода дистиллированная.

90 мл - флаконы темного стекла объемом 100 мл (1) в комплекте с мерной ложечкой - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противомикробный препарат широкого спектра действия для лечения инфекций ЖКТ, производное 5-нитрофурана. Предполагается, что противомикробное и противопаразитарное действие обусловлено наличием в составе нифуроксазида NO_2-группы, которая действует на клетку возбудителя и вызывает выраженный эффект при кишечных инфекционных заболеваниях.

Активен в отношении грамположительных микроорганизмов: Staphylococcus pyogenes, Streptococcus pyogenes, Clostridium spp.; *грамотрицательных энтеробактерий:* Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Vibrio cholerae, Yersinia spp., Citrobacter spp., Campylobacter spp., Edwarsiella spp.

Не влияет на сапрофитную флору, не нарушает равновесия нормальной кишечной флоры.

Фармакокинетика

После приема препарата внутрь нифуроксазид практически не абсорбируется из ЖКТ, проявляя свое антибактериальное действие только в просвете кишечника. Полностью выводится с калом. Скорость выведения зависит как от дозы, так и от моторики кишечника.

Показания к применению:

— острая и хроническая диарея инфекционного генеза (без признаков глистной инвазии).

Относится к болезням:

- Глисты
- Инфекции

Противопоказания:

— возраст до 1 месяца, недоношенные новорожденные;

— повышенная чувствительность к производным нитрофурана.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 7 лет препарат назначают по 200 мг 4 раза/сут, суточная доза - 800 мг; **детям от 2 до 7 лет** - по 200 мг 3 раза/сут, суточная доза - 600 мг.

Детям в возрасте младше 2 лет препарат назначают только в форме суспензии. Для дозирования используют мерную ложку. Для **детей в возрасте от 7 месяцев до 2 лет** рекомендуемая доза составляет 100 мг (2.5 мл или 1/2 мерной ложки) 4 раза/сут; **детям в возрасте от 1 до 6 месяцев** - 100 мг (2.5 мл или 1/2 мерной ложки) 2-3 раза/сут. Перед применением суспензию необходимо хорошо перемешать.

Продолжительность терапии не должна превышать 7 дней.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

Специфических симптомов передозировки нет.

Лечение: при необходимости рекомендуются стандартные меры неотложной помощи.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение при беременности и в период лактации по показаниям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не имеется данных о том, что нифуроксазид взаимодействует с другими лекарственными препаратами.

Особые указания и меры предосторожности:

При лечении диареи одновременно с применением Энтерофурила следует проводить регидратационную терапию (в/в или пероральную) в соответствии с состоянием пациента и степенью обезвоживания.

На фоне применения Энтерофурила запрещено употреблять алкоголь.

Применение в детском возрасте

Назначают препарат детям старше 1 месяца.

Противопоказан в возрасте до 1 месяца и у недоношенных новорожденных.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°С. Суспензию не замораживать. Срок годности для капсул - 5 лет, для суспензии для приема внутрь - 3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Enterofuril