Энтерол



Код АТХ:

- A07FA02

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капсулы*** желатиновые, №0, белого цвета, гладкие, блестящие, непрозрачные; содержимое капсул - светло-коричневый порошок с характерным дрожжевым запахом.

	1 капс.
лиофилизированные Saccharomyces boulardii	250 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, магния стеарат, желатин, титана диоксид.

10 шт. - флаконы стеклянные (1) - коробки картонные.
20 шт. - флаконы стеклянные (1) - коробки картонные.
30 шт. - флаконы стеклянные (1) - коробки картонные.
50 шт. - флаконы стеклянные (1) - коробки картонные.

◊ ***Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь*** светло-коричневый, с фруктовым ароматом.

	1 пак.
лиофилизированные Saccharomyces boulardii	100 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат 13 мг, фруктоза 188.76 мг, кремния диоксид коллоидный 2.5 мг, ароматизатор "тутти-фрутти" 1.74 мг.

306 мг - пакетики (10) бумажно-полиэтилено-алюминиевые - пачки картонные.
306 мг - пакетики (14) бумажно-полиэтилено-алюминиевые - пачки картонные.
306 мг - пакетики (20) бумажно-полиэтилено-алюминиевые - пачки картонные.
306 мг - пакетики (10) бумажно-полиэтилено-алюминиевые - пачки (2) картонные без верхней грани - пачки картонные.
306 мг - пакетики (10) бумажно-полиэтилено-алюминиевые - пачки (5) картонные без верхней грани - пачки картонные.

◊ ***Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь*** светло-коричневый, с фруктовым ароматом.

	1 пак.
лиофилизированные Saccharomyces boulardii	250 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат 32.5 мг, фруктоза 471.9 мг, кремния диоксид коллоидный 6.25 мг, ароматизатор "тутти-фрутти" 4.35 мг.

765 мг - пакетики (10) бумажно-полиэтилено-алюминиевые - пачки картонные.
765 мг - пакетики (20) бумажно-полиэтилено-алюминиевые - пачки картонные.
765 мг - пакетики (6) бумажно-полиэтилено-алюминиевые - пачки картонные (5) без верхней грани - пачки каронные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства
- Органотропные средства
- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противодиарейный препарат. Действие Энтерола обусловлено антагонистическим эффектом в отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов: Clostridium difficile, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida kruesei, Candida albicans, Candida pseudotropicalis, Salmonella typhimurium, Escherichia coli, Shigella dysenteriae, Yersinia enterocolitica, а также Enthamoeba hystolitica, Lamblia intestinalis.

Оказывает антитоксическое действие, особенно в отношении бактериальных цито- и энтеротоксинов. Улучшает ферментативную функцию кишечника. Saccharomyces boulardii обладают естественной устойчивостью к антибиотикам.

Фармакокинетика

После приема препарата внутрь Saccharomyces boulardii проходят через пищеварительный тракт в неизмененном виде без колонизации. Препарат полностью выводится из организма в течение 2-5 дней после прекращения приема.

Показания к применению:

— лечение и профилактика диареи любой этиологии.

Относится к болезням:

- Диарея

Противопоказания:

— наличие центрального венозного катетера, т.к. описаны редкие случаи возникновения фунгемии у больных с центральным венозным катетером в госпитальных условиях;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Назначают **взрослым и детям старше 3 лет** по 1-2 капсулы 2 раза/сут в течение 7-10 дней.

Детям в возрасте от 1 года до 3 лет препарат назначают по 1 капсуле 2 раза/сут в течение 5 дней.

Капсулы следует принимать за 1 ч до еды и запивать небольшим количеством жидкости. Для маленьких детей, а также в случае затрудненного глотания капсулу можно раскрыть и дать ее содержимое с холодной или чуть теплой водой.

Не рекомендуют запивать и разводить препарат горячей водой и алкогольными напитками.

Прием препарата для лечения острой диареи обязательно должен сопровождаться регидратацией.

Побочное действие:

Редко: проявления индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.

Передозировка:

В настоящее время случаи передозировки препарата Энтерол не описаны.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата Энтерол при беременности и в период лактации оправдано только в том случае, когда ожидаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с противогрибковыми препаратами для приема внутрь снижается клиническая эффективность препарата Энтерол (такая комбинация не рекомендуется).

Особые указания и меры предосторожности:

Пациента следует проинформировать, что при отсутствии улучшения состояния через 2 сут применения препарата Энтерол, а также при повышении температуры тела, обнаружении слизи или крови в каловых массах следует обратиться к врачу.

Ощущение жажды и сухости во рту свидетельствует о недостаточной регидратации организма.

Применение в детском возрасте

Назначают препарат детям старше 1 года.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Enterol