

Энтерол



Код АТХ:

- [A07FA02](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Капсулы** желатиновые, №0, белого цвета, гладкие, блестящие, непрозрачные; содержимое капсул - светло-коричневый порошок с характерным дрожжевым запахом.

	1 капс.
лиофилизированные <i>Saccharomyces boulardii</i>	250 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, магния стеарат, желатин, титана диоксид.

- 10 шт. - флаконы стеклянные (1) - коробки картонные.
- 20 шт. - флаконы стеклянные (1) - коробки картонные.
- 30 шт. - флаконы стеклянные (1) - коробки картонные.
- 50 шт. - флаконы стеклянные (1) - коробки картонные.

◇ **Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь** светло-коричневый, с фруктовым ароматом.

	1 пак.
лиофилизированные <i>Saccharomyces boulardii</i>	100 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат 13 мг, фруктоза 188.76 мг, кремния диоксид коллоидный 2.5 мг, ароматизатор "тутти-фрутти" 1.74 мг.

- 306 мг - пакетики (10) бумажно-полиэтилено-алюминиевые - пачки картонные.
- 306 мг - пакетики (14) бумажно-полиэтилено-алюминиевые - пачки картонные.
- 306 мг - пакетики (20) бумажно-полиэтилено-алюминиевые - пачки картонные.
- 306 мг - пакетики (10) бумажно-полиэтилено-алюминиевые - пачки (2) картонные без верхней грани - пачки картонные.
- 306 мг - пакетики (10) бумажно-полиэтилено-алюминиевые - пачки (5) картонные без верхней грани - пачки картонные.

◇ **Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь** светло-коричневый, с фруктовым ароматом.

Энтерол

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

	1 пак.
лиофилизированные <i>Saccharomyces boulardii</i>	250 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат 32.5 мг, фруктоза 471.9 мг, кремния диоксид коллоидный 6.25 мг, ароматизатор "тутти-фрутти" 4.35 мг.

765 мг - пакетики (10) бумажно-полиэтилено-алюминиевые - пачки картонные.

765 мг - пакетики (20) бумажно-полиэтилено-алюминиевые - пачки картонные.

765 мг - пакетики (6) бумажно-полиэтилено-алюминиевые - пачки картонные (5) без верхней грани - пачки каронные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противодиарейный препарат. Действие Энтерола обусловлено антагонистическим эффектом в отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов: *Clostridium difficile*, *Klebsiella pneumoniae*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Candida krusei*, *Candida albicans*, *Candida pseudotropicalis*, *Salmonella typhimurium*, *Escherichia coli*, *Shigella dysenteriae*, *Yersinia enterocolitica*, а также *Entamoeba histolytica*, *Lambliа intestinalis*.

Оказывает антитоксическое действие, особенно в отношении бактериальных цито- и энтеротоксинов. Улучшает ферментативную функцию кишечника. *Saccharomyces boulardii* обладают естественной устойчивостью к антибиотикам.

Фармакокинетика

После приема препарата внутрь *Saccharomyces boulardii* проходят через пищеварительный тракт в неизменном виде без колонизации. Препарат полностью выводится из организма в течение 2-5 дней после прекращения приема.

Показания к применению:

— лечение и профилактика диареи любой этиологии.

Относится к болезням:

- [Диарея](#)

Противопоказания:

— наличие центрального венозного катетера, т.к. описаны редкие случаи возникновения фунгемии у больных с центральным венозным катетером в госпитальных условиях;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Назначают **взрослым и детям старше 3 лет** по 1-2 капсулы 2 раза/сут в течение 7-10 дней.

Детям в возрасте от 1 года до 3 лет препарат назначают по 1 капсуле 2 раза/сут в течение 5 дней.

Капсулы следует принимать за 1 ч до еды и запивать небольшим количеством жидкости. Для маленьких детей, а также в случае затрудненного глотания капсулу можно раскрыть и дать ее содержимое с холодной или чуть теплой водой.

Не рекомендуют запивать и разводить препарат горячей водой и алкогольными напитками.

Прием препарата для лечения острой диареи обязательно должен сопровождаться регидратацией.

Побочное действие:

Редко: проявления индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.

Передозировка:

В настоящее время случаи передозировки препарата Энтерол не описаны.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата Энтерол при беременности и в период лактации оправдано только в том случае, когда ожидаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с противогрибковыми препаратами для приема внутрь снижается клиническая эффективность препарата Энтерол (такая комбинация не рекомендуется).

Особые указания и меры предосторожности:

Пациента следует проинформировать, что при отсутствии улучшения состояния через 2 сут применения препарата Энтерол, а также при повышении температуры тела, обнаружении слизи или крови в каловых массах следует обратиться к врачу.

Ощущение жажды и сухости во рту свидетельствует о недостаточной регидратации организма.

Применение в детском возрасте

Назначают препарат детям старше 1 года.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Enterol>