Энтерумин

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Активированный уголь
- Алюминия оксид

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь*** черного цвета, без запаха.

	1 пак.
алюминия оксид, покрытый углеродом	5 г

5 г - пакеты (10) - пачки картонные.
5 г - пакеты (20) - пачки картонные.

◊ ***Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь*** черного цвета, без запаха.

	1 пак.
алюминия оксид, покрытый углеродом	10 г

5 г - пакеты (10) - пачки картонные.
5 г - пакеты (20) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает энтеросорбирующее, дезинтоксикационное и противодиарейное действие, обладает высокой адсорбирующей активностью.

Выводит из ЖКТ патогенные микробные клетки , эндо - и экзотоксины различного происхождения. Не вызывает изменений водно-электролитного обмена, но способствует выведению тяжелых металлов, не поглощает в кишечнике сероводород, необходимый для поддержания нормальной перистальтики. Наиболее эффективен при заболеваниях, сопровождающихся интоксикацией средне- и высокомолекулярными веществами.

Фармакокинетика

Не растворяется в воде, спирте и биологических средах, не всасывается, не метаболизируется и выводится из кишечника в течение 24-48 часов.

Показания к применению:

Острые отравления и заболевания, сопровождающиеся эндотоксикозом, с возможным диарейным синдромом:

— кишечные инфекции;

— гнойно-септические заболевания;

— печеночная и/или почечная недостаточность;

— гепатит;

— аллергические заболевания;

— нарушения обмена веществ;

— ожоговая болезнь;

— абстинентный алкогольный синдром.

Относится к болезням:

- Аллергия
- Гепатит
- Гепатоз
- Диарея
- Инфекции

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— кровотечение из ЖКТ (или подозрение на него).

Способ применения и дозы:

Принимать внутрь в смоченном виде, запивая водой.

За 1 час до или после еды и приема других лекарственных средств.

Взрослым - по 3-5 пакетов 2-3 раза в день. **Детям** - по 1-3 пакета 2-3 раза в день.

Суточная доза - 0,3-1 г/кг (взрослым - 25-75 г, детям - 10-50 г).

При острых отравлениях , после промывания желудка - 100-150 г на прием однократно.

Побочное действие:

Возможны запоры, которые устраняются приемом небольшой дозы слабительного, диетой или снижением дозы препарата с увеличением продолжительности курса, аллергические реакции.

Передозировка:

Нет данных о передозировке препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Исследований по безопасности и эффективности применения препарата у беременных и кормящих матерей не проводилось.

При необходимости применения препарата в период беременности и лактации следует проконсультироваться с врачом с целью оценки соотношения пользы для матери и потенциального риска для плода/грудного ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат может снижать эффективность одновременно принимаемых лекарственных средств.

Особые указания и меры предосторожности:

Окрашивает каловые массы в черный цвет. Хранение препарата на воздухе снижает сорбционную способность.

Способность влиять на скорость реакций при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами

Прием препарата не оказывает влияния на скорость реакций при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Применение в детском возрасте

Назначают по показаниям

Условия хранения:

Хранить в сухом месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Enterumin