

Энтобан



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Сироп в виде вязкой жидкости коричневого цвета с характерным запахом.

	10 мл
сухой экстракт коры голаррены пушистой (Holarrhena antidysenterica Ness.)	50 мг
сухой экстракт плодов мирта обыкновенного (Myrtus communis L.)	200 мг
сухой экстракт плодов и корней барбариса остистого (Berberis aristata L.)	30 мг
сухой экстракт плодов айвы бенгальской (Aegle marmalos L.)	100 мг
сухой экстракт коры дуба красильного (Quercus infectoria L.)	50 мг
сухой экстракт листьев бутеи великолепной (Butea frondosa (L.) Willd)	20 мг

Вспомогательные вещества: сахароза, лимонная кислота безводная, глицерол, натрия хлорид, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, пропиленгликоль, масло мятное, ароматизатор "Тутти-фрутти", вода очищенная.

90 мл - флаконы темного стекла - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения, компоненты которого оказывают противовоспалительное, противомикробное, адсорбирующее, вяжущее и спазмолитическое действие.

Фармакокинетика

В соответствии с Международной конвенцией (ЕМЕАНMPWG11/99) при проведении клинических испытаний препаратов растительного происхождения не требуется изолированное исследование фармакокинетических параметров.

Показания к применению:

— острый и хронический диарейный синдром неинфекционной этиологии.

Относится к болезням:

- [Диарея](#)

Противопоказания:

- нарушения функции печени;
- воспалительные заболевания ЖКТ;
- кишечная непроходимость;
- диарея, вызванная дизентерией, гельминтозом, химическими веществами;
- наличие симптомов выраженного обезвоживания и электролитного баланса;
- беременность;
- лактация (период грудного вскармливания);
- детский возраст (до 18 лет);
- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь **взрослым** по 3 чайные ложки (по 15 мл) каждые 4 ч. Курс лечения - 10 дней.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

До настоящего времени случаи передозировки не описаны.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат содержит сахар, что следует учитывать больным сахарным диабетом, а также придерживающимся гипокалорийной диеты. В 15 мл сиропа (разовая доза) содержится 11.25 г сахара, что соответствует 0.94 ХЕ.

При нарушениях функции почек

Противопоказано при нарушении функции печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказано: детский возраст (до 18 лет).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Не применять по окончании срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Entoban>