

## [Эринит](#)



### **Код АТХ:**

- [C01DA05](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Пентаэритрита тетранитрат](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Органотропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Периферический вазодилататор с преимущественным влиянием на венозные сосуды, антиангинальное средство. Действие связано с уменьшением преднагрузки (расширение периферических вен и уменьшение притока крови к правому предсердию) и постнагрузки (уменьшение ОПСС), а также с непосредственным коронарорасширяющим эффектом. Способствует перераспределению коронарного кровотока в области со сниженным кровоснабжением. У больных с ИБС, стенокардией повышает толерантность к физической нагрузке. При сердечной недостаточности способствует разгрузке миокарда за счет уменьшения преднагрузки. Снижает давление в малом круге кровообращения. По сравнению с нитроглицерином действие развивается медленнее, но характеризуется большей продолжительностью.

#### **Фармакокинетика**

При приеме внутрь пентаэритрита тетранитрат медленно абсорбируется из ЖКТ.

## Показания к применению:

ИБС, стенокардия (профилактика приступов, в т.ч. в постинфарктном периоде); сердечная недостаточность (в составе комплексной терапии).

## Относится к болезням:

- [Стенокардия](#)

## Противопоказания:

Острый или недавно перенесенный инфаркт миокарда, выраженная артериальная гипотензия, повышенное внутричерепное и внутриглазное давление, повышенная чувствительность к пентаэритритила тетранитрату.

## Способ применения и дозы:

Дозу устанавливают индивидуально. Внутрь - по 20 мг 3-4 раза/сут, при необходимости дозу можно увеличить до 40 мг 4 раза/сут или принимать по 80 мг 2 раза/сут.

## Побочное действие:

*Со стороны пищеварительной системы:* диспептические симптомы.

*Со стороны ЦНС:* чувство усталости, беспокойство; редко - головная боль, головокружение.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* редко - ортостатическая гипотензия.

*Прочие:* повышенная потливость, кожные аллергические реакции.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период лактации применять с осторожностью.

## Особые указания и меры предосторожности:

В связи с медленным развитием эффекта пентаэритритила тетранитрат не применяют для купирования приступов стенокардии.

С осторожностью применяют при нарушениях мозгового кровообращения (особенно при геморрагическом инсульте), при склонности к артериальной гипотензии, у лиц пожилого возраста.

При длительном применении возможно снижение терапевтического эффекта (вследствие развития толерантности). При применении препарата 1 раз/сут в сочетании с другими антиангинальными препаратами риск развития толерантности меньше.

В период лечения противопоказано употребление алкоголя.

### **Применение в пожилом возрасте**

С осторожностью применяют у лиц пожилого возраста.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Erinit>