

## Эриспирус



### Код АТХ:

- [R03DX03](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Фенспирид](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

### Форма выпуска:

Сироп, 2 мг/мл. По 150 мл сиропа во флаконе желтого стекла, укупоренном завинчивающейся крышкой с защитным кольцом. По 1 фл. в комплекте с дозирующей пластиковой ложкой в пачке картонной.

### Состав:

Сироп	1 мл
<i>активное вещество:</i>	
фенспирида гидрохлорид	2 мг
<i>вспомогательные вещества:</i> сахароза — 600 мг; глицерин — 225 мг; краситель «Солнечный закат» желтый (E110) — 0,1 мг; калия сорбат — 1,9 мг; натрия сахаринат — 0,45 мг; ароматизатор вишневый — 1,2 мг; лимонной кислоты моногидрат — q.s. (для доведения pH до требуемого значения 5); натрия гидроксид — q.s. (для доведения pH до требуемого значения 5); вода —	

до 1 мл

---

## Фармакотерапевтическая группа:

- [Интермедянты](#)

## Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — противовоспалительное, бронходилатирующее, антигистаминное.

## Показания к применению:

Ринофарингит, ларингит, отит, синусит, ринотрахеобронхит, бронхит, поддерживающая терапия изолированной и осложненной бронхиальной астмы, симптомы со стороны дыхательных путей при кори, коклюше, гриппе.

## Относится к болезням:

- [Бронхит](#)
- [Грипп](#)
- [Коклюш](#)
- [Ларингит](#)
- [Отит](#)
- [Синусит](#)

## Противопоказания:

Повышенная чувствительность к фенспириду, беременность, период лактации, детский возраст до 14 лет (для таблеток).

## Способ применения и дозы:

Принимают внутрь до еды. Взрослым - по 80 мг 2-3 раза/сут; детям - 4 мг/кг/сут.

## Побочное действие:

*Возможно:* умеренно выраженные диспептические явления, тошнота, боли в эпигастрии, сонливость.

*Редко:* умеренная тахикардия.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Фенспирид противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## Особые указания и меры предосторожности:

Лечение фенспиридом не заменяет антибактериальную терапию и не может служить причиной для откладывания адекватного назначения антибактериальных препаратов.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Erispirus>