

## [Эрисирус \(таблетки\)](#)

**Код АТХ:**

- [R03DX03](#)

**Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Фенспирид](#)

**Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

**Форма выпуска:**

Сироп, 2 мг/мл. По 150 мл сиропа во флаконе желтого стекла, укупоренном завинчивающейся крышкой с защитным кольцом. По 1 фл. в комплекте с дозирующей пластиковой ложкой в пачке картонной.

**Состав:**

Сироп	1 мл
<i>активное вещество:</i>	
фенспирида гидрохлорид	2 мг
<i>вспомогательные вещества:</i> сахароза — 600 мг; глицерин — 225 мг; краситель «Солнечный закат» желтый (E110) — 0,1 мг; калия сорбат — 1,9 мг; натрия сахаринат — 0,45 мг; ароматизатор вишневый — 1,2 мг; лимонной кислоты моногидрат — q.s. (для доведения pH до требуемого значения 5); натрия гидроксид — q.s. (для доведения pH до требуемого значения 5); вода —	

## Эриспирус (таблетки)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

до 1 мл

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Интермедианты](#)

### Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — противовоспалительное, бронходилатирующее, антигистаминное.

#### Фармакодинамика

Средство с бронхолитическим и противовоспалительным действием. Уменьшает проявления бронхоспазма и воспаления в дыхательных путях. Механизм действия связан с антагонистической активностью в отношении гистаминовых H<sub>1</sub>-рецепторов и с миотропной спазмолитической активностью. Уменьшает продукцию ряда биологически активных веществ, участвующих в развитии воспаления и способствующих повышению тонуса бронхов (в т.ч. цитокинов, ФНОα, производных арахидоновой кислоты, свободных радикалов).

#### Фармакокинетика

Хорошо абсорбируется из ЖКТ. C<sub>max</sub> достигается через 6 ч после приема и через 12 ч снижается в 3 раза. Выводится преимущественно почками (90%), через кишечник – 10%. T<sub>1/2</sub> - 12 ч.

### Показания к применению:

Ринофарингит, ларингит, отит, синусит, ринотрахеобронхит, бронхит, поддерживающая терапия изолированной и осложненной бронхиальной астмы, симптомы со стороны дыхательных путей при кори, коклюше, гриппе.

### Относится к болезням:

- [Бронхит](#)
- [Грипп](#)
- [Коклюш](#)
- [Ларингит](#)
- [Отит](#)
- [Синусит](#)

### Противопоказания:

Повышенная чувствительность к фенспириду, беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет (для таблеток), детский возраст до 2 лет (для сиропа).

### Способ применения и дозы:

Принимают внутрь до еды. Взрослым - по 80 мг 2-3 раза/сут; детям старше 2 лет (в соответствующей лекарственной форме) - 4 мг/кг/сут.

### Побочное действие:

*Возможно:* умеренно выраженные диспептические явления, тошнота, боли в эпигастрии, сонливость.

*Редко:* умеренная тахикардия.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Фенспирид противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Диагнозы

- Боли в горле
- Гайморит
- Заболевания уха
- Ларингит

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Erispirus\\_tabletki](http://drugs.thead.ru/Erispirus_tabletki)