

## [Эриспидус](#)



### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Средство с бронхолитическим и противовоспалительным действием. Уменьшает проявления бронхоспазма и воспаления в дыхательных путях. Механизм действия связан с антагонистической активностью в отношении гистаминовых H<sub>1</sub>-рецепторов и с миотропной спазмолитической активностью. Уменьшает продукцию ряда биологически активных веществ, участвующих в развитии воспаления и способствующих повышению тонуса бронхов (в т.ч. цитокинов, ФНО $\alpha$ , производных арахидоновой кислоты, свободных радикалов).

#### **Фармакокинетика**

Хорошо абсорбируется из ЖКТ. C<sub>max</sub> достигается через 6 ч после приема и через 12 ч снижается в 3 раза. Выводится преимущественно почками (90%), через кишечник - 10%. T<sub>1/2</sub> - 12 ч.

### **Показания к применению:**

Ринофарингит, ларингит, отит, синусит, ринотрахеобронхит, бронхит, поддерживающая терапия изолированной и осложненной бронхиальной астмы, симптомы со стороны дыхательных путей при кори, коклюше, гриппе.

### **Относится к болезням:**

- [Бронхит](#)
- [Грипп](#)
- [Коклюш](#)
- [Ларингит](#)
- [Отит](#)
- [Синусит](#)

### **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к фенспириду, беременность, период лактации, детский возраст до 14 лет (для таблеток).

### **Способ применения и дозы:**

Принимают внутрь до еды. Взрослым - по 80 мг 2-3 раза/сут; детям - 4 мг/кг/сут.

### **Побочное действие:**

Возможно: умеренно выраженные диспептические явления, тошнота, боли в эпигастрине, сонливость.

Редко: умеренная тахикардия.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Фенспирид противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Лечение фенспиридом не заменяет антибактериальную терапию и не может служить причиной для откладывания адекватного назначения антибактериальных препаратов.

#### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан в детском возрасте до 14 лет (для таблеток).

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Erispius>