Эрвы шерстистой трава



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Эрвы шерстистой трава

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Сырье растительное измельченное	**1 пачка**
эрвы шерстистой трава	30 г

Пакеты бумажные (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Настой травы эрвы шерстистой оказывает диуретическое, а также умеренное противовоспалительное действие. При этом отмечено выведение ионов натрия и кальция и, в некоторой степени, ионов калия. При применении препарата отмечается также тенденция к снижению содержания мочевины в сыворотке крови.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии у взрослых при неспецифических инфекционно-воспалительных заболеваниях почек (в том числе пиелонефрит) и мочевыводящих путей с умеренно выраженным отечным синдромом.

Относится к болезням:

- Инфекции

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к препарату. Остеопороз; заболевания, сопровождающиеся повышенным выведением кальция из организма, в том числе гипопаратиреоз, рахит, почечная остеодистрофия. Беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы:

Около 5 г (1 столовая ложка) измельченной травы помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин, затем охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Возможно приготовление настоя в термосе: 5 г травы заливают 200-250 мл крутого кипятка и настаивают в течение 1 ч. Принимают внутрь в теплом виде по 1/4 - 1/2 стакана 2-3 раза в день за 15 мин до еды. Курс лечения от 10 до 30 дней. Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, тошнота.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан: беременность, период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

Противопоказан: почечная остеодистрофия.

Применение в детском возрасте

Противопоказан: детский возраст до 18 лет.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте. Готовый настой - в прохладном месте не более 2-х сут. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности. 3 года. Не использовать после истечения срока годности указанного на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ervy_sherstistoy_trava