

## Эсцизан



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Тритерпеновый гликозид (сапонин) из плодов (семян) конского каштана (в виде натриевой соли). Обладает выраженной капилляропротективной активностью, оказывает антиэкссудативное действие.

#### **Фармакокинетика**

После приема внутрь 50 мг экстракта плодов конского каштана  $C_{max}$  в плазме крови достигается через 2.35 ч и составляет 25.31 нг/мл.

Связывание с белками плазмы составляет 84%.

$T_{1/2}$  составляет 19.87 ч. После приема внутрь 0.11% экстракта плодов конского каштана выводится почками в виде эсцина.

### Показания к применению:

Посттромбофлебитический синдром и отдельные симптомы хронической венозной недостаточности различной этиологии (в т.ч. отеки, судороги в икроножных мышцах, боли и чувство тяжести в ногах), варикозное расширение вен, трофические нарушения. Посттравматические или послеоперационные отеки мягких тканей.

### Относится к болезням:

- [Венозная недостаточность](#)
- [Отеки](#)
- [Судороги](#)

### Противопоказания:

Почечная недостаточность, I триместр беременности, повышенная чувствительность к эсцину.

### Способ применения и дозы:

## Эсцизан

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

В/в взрослым - 5-10 мг/сут, детям в возрасте до 3 лет - 100 мкг/кг/сут, от 3 до 10 лет - 200 мкг/кг/сут.

Доза для приема внутрь зависит от лекарственной формы и определяется индивидуально.

При наружном применении осторожно втирают в области поражения несколько раз в сутки.

### **Побочное действие:**

*Аллергические реакции:* кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек, анафилактический шок, жар.

*Со стороны пищеварительной системы:* диспепсия, тошнота.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Эсцин противопоказан к применению в I триместре беременности. Возможно применение в III триместре беременности, особенно при появлении отеков нижних конечностей и отсутствии нефропатии.

Не рекомендуется применение в период лактации (грудного вскармливания).

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При в/в введении эсцина женщинам, принимающим гормональные противозачаточные средства, дозу растворителя следует удвоить.

При одновременном применении с эсцином возможно усиление нефротоксического действия антибиотиков группы аминогликозидов.

При одновременном применении с эсцином возможно усиление активности антикоагулянтов и других лекарственных средств с антитромботическим действием.

При одновременном применении цефалоспорины вытесняют эсцин из связей с белками плазмы.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Во время лечения следует периодически контролировать функцию почек.

#### ***При нарушениях функции почек***

Противопоказан при почечной недостаточности.

Во время лечения следует периодически контролировать функцию почек.

#### ***Применение в детском возрасте***

Применение возможно согласно режиму дозирования.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Escizan>