Эскузан



Код АТХ:

- C05CX

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Раствор для приема внутрь. По 20 мл во флаконе темного стекла с пробкой-капельницей и навинчивающейся пластмассовой крышкой. Флакон в картонной пачке.

Состав:

Раствор для приема внутрь	100 г
активные вещества:	
конского каштана семян экстракт сухой (*Hippocastani extractum siccum normatum*) 5–7:1	4,725 г
(экстрагент — этанол 60% об/об)	
тиамина гидрохлорид	0,5 г
вспомогательные вещества: этанол 96% — 26,4 г; вода очищенная — 67,675 г; лактозы моногидрат — 0,432 г; кремния диоксид коллоидный — 0,243 г	

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — венотонизирующее, антиэкссудативное.

Фармакодинамика
Препарат, применяемый при нарушениях венозного кровообращения. Содержит экстракт плодов конского каштана,

оказывает антиэкссудативное, венотонизирующее действие. Установлено, что экстракт плодов конского каштана уменьшает концентрацию лизосомальных энзимов, в результате этого снижается распад мукополисахаридов в области стенок капилляров. Эскузан снижает проницаемость сосудов, предотвращая фильтрацию низкомолекулярных протеинов, электролитов и воды в межклеточное пространство. В рандомизированных двойных слепых и перекрестных исследованиях отмечалось снижение транскапиллярной фильтрации и значительное уменьшение отеков, уменьшение чувства тяжести, усталости, напряженности, зуда, боли.

Фармакокинетика

Всасывание и распределение

После приема внутрь 50 мг экстракта плодов конского каштана C_{max} в плазме крови достигается через 2.35 ч и составляет 25.31 нг/мл.

Связывание с белками плазмы составляет 84%.

Выведение

$T_{1/2}$ составляет 19.87 ч. После приема внутрь 0.11% экстракта плодов конского каштана выводится почками в виде эсцина.

Показания к применению:

Хроническая венозная недостаточность варикозного и посттромботического генеза и ее осложнения, в т.ч. заболевания, связанные с функциональным нарушением кровоснабжения:

— отеки, судороги в икроножных мышцах;

— боль и чувство тяжести в ногах;

— варикозное расширение вен;

— геморроидальные узлы.

Относится к болезням:

- Варикоз
- Венозная недостаточность
- Геморрой
- Отеки
- Судороги

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Назначают внутрь по 12-15 капель 3 раза/сут.

Препарат следует принимать перед едой с небольшим количеством жидкости.

Перед приемом препарата содержимое флакона следует взболтать.

Побочное действие:

Редко: редко - раздражение слизистой оболочки ЖКТ.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки препарата Эскузан не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Диагнозы

- Тромбоз глубоких вен
- Тромбофлебит
- Трофическая язва голени, стопы

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Действие тиамина, входящего в состав препарата Эскузан, уменьшается при одновременном применении с сульфитосодержащими инфузионными растворами.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат содержит 31 об.% этанола.

При длительном хранении возможно помутнение раствора и выпадение осадка, что не оказывает влияния на эффективность препарата.

Условия хранения:

Препарат следует хранить при температуре от 8° до 25°С; не замораживать. Срок годности – 3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Eskuzan