

## Эслидин



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Капсулы** твердые желатиновые, №0, с корпусом светло-коричневого цвета и крышечкой коричневого цвета; содержимое капсул - желто-коричневая или коричневая однородная масса от мазеобразной до более плотной консистенции с характерным запахом.

	<b>1 капс.</b>
метионин	100 мг
фосфолипиды полиненасыщенные из соевого лецитина (липоид ППЛ-400)	300 мг

*Вспомогательные вещества:* масло соевое.

*Состав оболочки капсулы:* титана диоксид, железа оксид черный, железа оксид красный, железа оксид желтый, вода очищенная, желатин.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2, 3, 4, 5, 6, 9, 10) - пачки картонные.

15 шт. - упаковки ячейковые контурные (2, 3, 4, 5, 6, 9, 10) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает гепатопротекторное действие, нормализует все виды обмена веществ (жировой, белковый, углеводный).

Метионин, один из активных компонентов препарата, - это незаменимая аминокислота, которая является источником подвижных метильных групп. Метионин необходим для синтеза холина. Увеличение содержания холина способствует увеличению синтеза эндогенных (внутренних) фосфолипидов и уменьшению отложения в печени нейтрального жира. Метионин также необходим для обезвреживания ксенобиотиков. При атеросклерозе снижает концентрацию холестерина и повышает концентрацию фосфолипидов крови.

Эссенциальные фосфолипиды - это незаменимые факторы для развития и функционирования клеток печени. Основная фракция эссенциальных фосфолипидов в препарате представлена фосфатидилхолином (73%), который является основным компонентом биологических мембран. Попадая в организм, фосфатидилхолин восстанавливает целостность мембран пораженных клеток печени и активирует расположенные в мембране фосфолипидзависимые ферменты, нормализуя тем самым проницаемость и усиливая дезинтоксикационный и экскреторный потенциал клеток печени.

Метионин и эссенциальные фосфолипиды усиливают действие друг друга, являясь источником эндогенных и экзогенных фосфолипидов соответственно, улучшают функциональное состояние клеток печени и оказывают гепатопротекторный эффект.

Метионин также участвует в обмене серосодержащих аминокислот, в синтезе эpineфрина, креатинина и других биологически активных соединений, преобразует действие гормонов, витаминов (В<sub>12</sub>, аскорбиновой, фолиевой кислот), ферментов, белков, участвует в реакциях переметилирования, дезаминирования, декарбоксилирования.

Эслидин восстанавливает функцию печени, повышает ее дезинтоксикационную способность, а также нормализует жировой, углеводный и белковый обмен веществ в организме.

**Фармакокинетика**

Данные о фармакокинетике препарата Эслидин не предоставлены.

**Показания к применению:**

Препарат применяется в гастроэнтерологии, дерматологии, неврологии, кардиологии.

- жировая дистрофия печени различной этиологии;
- острый и хронический гепатит (кроме вирусного);
- цирроз печени;
- токсическое поражение печени (алкогольное, наркотическое, лекарственное);
- нарушение функции гепатоцитов (как осложнение при других заболеваниях);
- пред- и послеоперационное лечение при операциях в области гепатобилиарной зоны;
- псориаз (в составе комплексной терапии);
- атеросклероз сосудов головного мозга (в составе комплексной терапии);
- атеросклероз коронарных артерий (в составе комплексной терапии);
- сахарный диабет (в составе комплексной терапии);
- истощение, дистрофия.

**Относится к болезням:**

- [Атеросклероз](#)
- [Гастрит](#)
- [Гастроэнтерит](#)
- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Дерматит](#)
- [Жировая дистрофия печени](#)
- [Кардит](#)
- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)
- [Псориаз](#)
- [Сахарный диабет](#)

**Противопоказания:**

- тяжелая печеночная недостаточность, печеночная энцефалопатия;
- вирусный гепатит;
- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью следует применять препарат при беременности, у детей в возрасте от 3 до 7 лет, при почечной недостаточности (из-за опасности нарастания гиперазотемии).

**Способ применения и дозы:**

---

## Эслидин

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Препарат принимают внутрь, во время еды. Капсулы следует проглатывать целиком, запивая достаточным количеством воды.

При *заболеваниях печени, атеросклерозе коронарных артерий и сосудов головного мозга, сахарном диабете, дистрофии и истощении* назначают по 2 капсулы 3 раза/сут. Рекомендуемый курс лечения - 3 мес, минимальный курс - 1 мес.

При *псориазе* - по 2 капсулы 3 раза/сут. Рекомендуемый курс лечения - 2 недели.

**Детям старше 7 лет** при *заболеваниях печени, сахарном диабете, жировой дистрофии печени* - по 2 капсулы 3 раза/сут в течение 1-3 мес.

При *псориазе* **детям старше 7 лет** - по 2 капсулы 3 раза/т в течение 2 недель.

**Детям от 3 до 7 лет** назначают по 1 капсуле 3 раза сут в течение 1-3 мес.

## Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

## Передозировка:

При случайном превышении суточной дозы в несколько раз возможно снижение АД, усиление ЧСС, дезориентация.

*Лечение:* проводят симптоматическую терапию.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Исследований, подтверждающих безопасность Эслидина для плода и безопасность для ребенка во время грудного вскармливания, не проводилось.

Применение препарата при беременности и в период лактации возможно только по назначению врача в случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает возможный риск для плода и ребенка.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Эслидин не описано.

## Особые указания и меры предосторожности:

### **При нарушениях функции почек**

С *осторожностью* следует применять препарат при почечной недостаточности (из-за опасности нарастания гипернатриемии).

### **При нарушениях функции печени**

Противопоказан при тяжелой печеночной недостаточности, печеночной энцефалопатии, вирусном гепатите.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказание: детский возраст до 3 лет. С *осторожностью* следует применять препарат у детей в возрасте от 3 до 7 лет.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Не применять препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Срок годности:**

2 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Eslidin>